herpy

GRODOR

Red-eyed Green Treefrog

Ranoidea chloris

Ranoidea chloris är en vacker, klargrön lövgroda på 5-7 cm från regnskogar och fuktig skog längs Australiens östkust. Den har gul buk, lila lår och röda ögon och lever högt uppe i trädkronorna, så den syns bara sällan utanför häckningstiden. Det finns bara lite kunskap om skötseln, så den bygger på besläktade australiska lövgrodor.

Familj: Pelodryadidae Tidigare namn: *Litoria chloris; Chlorohyla chloris* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**5-7 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och tempererad skog och äng**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattendel** djup 5-10 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Ägg per läggning	**50-500**
Läggningar per år	**1-5**
Larvtid	**41-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ranoidea chloris*.
TEMPERATUR	På dagen ska temperaturen vara 22-27 °C och på natten 16-20 °C. En sval natt är naturlig, eftersom utbredningsområdet har svalare nätter än norra Australien. Siffrorna är en uppskattning utifrån klimatet i utbredningsområdet.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 70-90 %. Dimma terrariet en gång om dagen, gärna på kvällen när grodan vaknar, och låt botten torka upp något emellan. En stor, fast vattendel håller kvar fukten, och då räcker dimning var 3:e-4:e dag.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	*Ranoidea chloris* förökar sig i lågt vatten, så en fast vattendel eller en stor, låg vattenskål passar arten.
LJUS OCH UVB	Arten behöver ljus för växterna och en fast dygnsrytm med 12-14 timmars dag och mörka nätter. Lysrör eller LED värmer mindre än glödlampor.
UTFODRING	Fodret är levande insekter: syrsor, vandringsgräshoppor, flugor, malar, dubiakackerlackor och ett mindre antal mjölmaskar. Bytet får inte vara längre än avståndet mellan grodans ögon.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är nattaktiv och anpassar sig till fångenskap utan problem. Den blir ofta lugn vid regelbunden kontakt, men tål mycket hantering dåligt, eftersom huden är känslig.
NATURLIG UTBREDNING	Australien.