herpy

GRODOR

Black-webbed Treefrog

Rhacophorus kio

Rhacophorus kio är en stor, gräsgrön flygpadda från regnskogarna i södra Kina, Laos, Thailand och Vietnam. Honorna blir upp till 8 cm. Simhuden är orangegul med en svart fläck vid roten av varje finger och tå, och grodan spänner ut den när den glider mellan träden. Arten är nattaktiv och skygg, och det finns bara lite kunskap om skötseln i fångenskap.

Familj: Rhacophoridae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-8 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-3 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I ett skumbo**
Ägg per läggning	**130-180**
Kläckning	**5 dagar**
Larvtid	**45-85 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Rhacophorus kio*.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 21-24 °C på dagen, vilket motsvarar vanlig rumstemperatur, och låt det gärna sjunka till 18-21 °C på natten. Korta perioder upp till 27-28 °C tål grodan, men temperaturen får inte överstiga 28 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-90 %, lägst på dagen och högst på natten.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ställ en stabil, låg vattenskål i terrariet, som grodan kan sitta i på natten. 2-3 cm vatten räcker, så att grodan lätt tar sig upp igen. Byt vattnet så fort det är smutsigt, och helst varje dag eller varannan dag.
LJUS OCH UVB	Grodan är trädlevande, och en svag UVB-källa av den typ som används för tropiska skogsdjur rekommenderas. Ett lågt UV-index på de översta bladen (Ferguson-zon 1) är en försiktig utgångspunkt.
UTFODRING	*Rhacophorus kio* äter levande insekter. Syrsor kan användas hela livet, från små nykläckta till stora, kompletterade med små kackerlackor, soldatflugelarver och en sällsynt vaxmott-larv som godbit.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är nattaktiv och skygg och tillbringar dagen gömd mellan bladen; större delen av tiden sitter den på glaset eller inredningen.
NATURLIG UTBREDNING	Kina, Laos, Thailand och Vietnam.