herpy

GRODOR

Wallace's Flying Frog

Rhacophorus nigropalmatus

Rhacophorus nigropalmatus är en av de största flygpaddorna och lever högt uppe i regnskogen på Borneo, Sumatra och Malackahalvön. Den är smaragdgrön med svart simhud mellan fingrar och tår, och med sin utspända simhud kan den glida upp till 15 m mellan träden. Honorna blir upp till 10 cm. Arten kräver ett mycket stort, högt och varmt terrarium, och det finns bara lite kunskap om skötsel och avel.

Familj: Rhacophoridae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**8-10 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 80 × 120 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattendel** djup 10 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I ett skumbo**
Ägg per läggning	**800**
Larvtid	**42-85 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Rhacophorus nigropalmatus*, och siffrorna här bygger på arten själv och på den nära släktingen *Rhacophorus reinwardtii*, som är mindre.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 24-28 °C på dagen och 21-23 °C på natten. Det motsvarar låglandsregnskogen där arten lever, och temperaturen ska inte överstiga 30 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-90 %. Spraya terrariet noggrant varje dag med avklorerat kranvatten, regnvatten eller osmosvatten, och låt det torka upp något under dagen.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Arten ska ha en fast vattendel, som den kan sitta i och lägga ägg över. Vattnet ska vara 10 cm djupt, och grodan ska lätt kunna ta sig upp igen via grenar, kork och stenar.
LJUS OCH UVB	Grodan lever högt uppe i trädkronorna, och en svag UVB-källa av den typ som används för tropiska skogsdjur rekommenderas. Det är inte undersökt om arten behöver den, så ge alltid skuggiga platser där grodan kan dra sig undan.
UTFODRING	*Rhacophorus nigropalmatus* äter levande insekter.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är skygg och nattaktiv och tillbringar dagen gömd mellan bladen, ofta sittande hopkrupen på en gren eller på glaset. På natten blir den aktiv, klättrar och glider.
NATURLIG UTBREDNING	Thailand, Myanmar (Burma), Malaysia, Indonesien och Brunei.