herpy

GRODOR

Hill Garden Bug-eyed Frog

Theloderma asperum

Theloderma asperum är en liten, nattaktiv lövgroda från skogarna i Sydostasien. Den är svartbrun med vita vårtor som liknar fågelspillning och har djupt rubinröda ögon. Arten tål mer värme än de övriga släktingarna och trivs i ett litet, fuktigt terrarium med en vattendel. Den ropar ganska kraftigt och hålls bäst i en liten grupp.

Familj: Rhacophoridae Tidigare namn: *Philautus asper*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och semiakvatisk**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**17-21 °C**
Luftfuktighet	**75-95 %**
Vatten	**Vattendel** djup 5-10 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Könsmogen	**6-10 mån.**
Ägg per läggning	**4-15**
Kläckning	**7-14 dagar**
Larvtid	**75-180 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Theloderma asperum är liten och kan hållas i ett relativt kompakt terrarium. Ett terrarium på 45 × 45 × 45 cm (längd × bredd × höjd) passar för en liten grupp på fyra djur.

TEMPERATUR

På dagen ska temperaturen vara 20-24 °C, och på natten 17-21 °C. Arten tål kortvarigt ned till cirka 10 °C och klarar 24-25 °C utan problem, men över 27 °C blir det farligt och kan vara dödligt.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten hålls på 75-95 %. Arten tål korta perioder ned till cirka 50 % om det finns tillgång till vatten, men torr luft utan vatten kan snabbt vara ödesdiger.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Grodan håller sig mycket vid vattenkanten och sitter till och med under vatten, så vattendelen är inte bara för prydnad.

LJUS OCH UVB

Grodan är nattaktiv och har inget dokumenterat behov av UVB. Ett svagt UVB-rör för skuggarter (Ferguson-zon 1) kan användas och är valfritt, men då ska grodorna alltid kunna dra sig undan i skugga.

UTFODRING

T. asperum äter insekter. Små syrsor är det viktigaste fodret, kompletterat med vaxmott-larver, flugor, hoppstjärtar till de minsta ungarna, små dubia-kackerlackor och soldatflugelarver.

BETEENDE OCH HANTERING

Theloderma asperum är nattaktiv och sitter på dagen gömd i rör, mellan växter eller nära vattnet.

NATURLIG UTBREDNING

Malaysia, Thailand, Myanmar (Burma), Indien, Bangladesh, Bhutan, Vietnam, Kambodja och Indonesien.