herpy

GRODOR

Chapa Bug-eyed Frog

Theloderma bicolor

Theloderma bicolor är en liten, mossgrön groda från de fuktiga bergsskogarna i norra Vietnam och södra Kina. Den är tillplattad och täckt av knöliga vårtor, så att den nästan försvinner bland mossa och lav. Arten är nattaktiv och behöver ett svalt, fuktigt terrarium med en vattendel, eftersom den inte tål värme. Skötseln liknar övriga mossgrodors, men flera avelsuppgifter är lånade från släktingar inom släktet.

Familj: Rhacophoridae Tidigare namn: *Rhacophorus leprosus bicolor; Rhacophorus bicolor*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-6 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Bergsskog och klippterräng**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 30 × 40 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**16-20 °C**
Temperatur, natt	**13-18 °C**
Luftfuktighet	**80-90 %**
Vatten	**Vattendel** djup 5-10 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Könsmogen	**8-10 mån.**
Ägg per läggning	**3-25**
Kläckning	**9-22 dagar**
Larvtid	**75-180 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Skötseln av *Theloderma bicolor* liknar den för släktingarna *Theloderma corticale* och *Theloderma asperum*, men arten ska hållas svalare. Den trivs bara i ett terrarium där temperaturen kan hållas låg.
TEMPERATUR	Arten är en bergsgroda och tål inte värme. På dagen ska det vara 16-20 °C och på natten 13-18 °C, vilket passar klimatet på höglandet.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-90 %, och aldrig under 60 %.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattendelen är en fast del av terrariet. Ge 5-10 cm vatten med korkplattor och korkrör som land och gömställe.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv, så ljuset är främst till för växterna. Ett lysrör på 6.500 K i 12 timmar om dagen räcker för växter som pothos och fredskalla.
UTFODRING	*Theloderma bicolor* äter levande insekter. Använd syrsor som bas, kompletterade med vaxmalslarver, dubia-kackerlackor, flugor och soldatflugelarver. Foderdjuren får högst vara lika långa som avståndet mellan grodans ögon.
BETEENDE OCH HANTERING	*Theloderma bicolor* sitter på dagen gömd bland växter och i kork och kommer fram när det blir mörkt. Djuren kan hållas i par eller i en liten grupp på tre till fyra, om terrariet har tillräckligt med plats och gömställen.
NATURLIG UTBREDNING	Vietnam och Kina.