herpy

GRODOR

## Amazon Milk Frog

# *Trachycephalus resinifictrix*

*Trachycephalus resinifictrix* är en stor, kraftig och nattaktiv trädgroda från Amazonas trädkronor. Ungdjuren är svart- och vitrandiga, de vuxna marmorerade, och när den hotas avger grodan ett mjölkvitt hudsekret. Den leker i vattenfyllda trädhål, är robust att hålla och liknar i mycket *Ranoidea caerulea*.

Familj: Hylidae  Tidigare namn: *Phrynohyas resinifictrix*  **Mild hudgift**

### FAKTARUTA

#### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **6-10 cm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **8-10 år** |
| Aktiv | **På natten** |
| Levnadssätt | **Trädlevande** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Hudgift | **Mild**<br>Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

#### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodyngel i vatten** |
| Äggläggning | **I vatten** |
| Könsmogen | **12-18 mån.** |
| Ägg per läggning | **100-1 500** |
| Kläckning | **1-2 dagar** |
| Larvtid | **21-75 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Färdigfoder** |
| Yngelvård | **Ingen** |

#### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **75 × 30 × 45 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **21-29 °C** |
| Temperatur, natt | **18-21 °C** |
| Luftfuktighet | **50-100 %** |
| Vatten | **Vattenskål** |
| UVB | **Rekommenderas**<br>Fergusonzon 2 |
| Föda | **Insekter och maskar/sniglar** |
| Hålls | **Ensamma, parvis eller i grupp** |

#### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ej listad** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Ett vuxet par ska ha ett terrarium på minst 75 × 30 × 45 cm (längd × bredd × höjd), och det räcker för upp till fyra vuxna. En grupp på fem ska ha minst 60 × 45 × 60 cm. |
| **TEMPERATUR** | *Trachycephalus resinifictrix* tål ett brett temperaturspann. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING** | Luftfuktigheten är mindre kritisk än temperaturen, men terrariet ska duschas minst en gång om dagen. Använd avklorerat kranvatten eller osmosvatten, som inte heller ger kalkfläckar på glaset. |
| **VATTEN OCH VATTENKVALITET** | *Trachycephalus resinifictrix* ska ha en stor skål med rent vatten, som motsvarar trädhålet i naturen. Skålen ska vara så stor att grodan kan sitta i den, och den används nästan varje natt, så snåla inte med storleken. |
| **LJUS OCH UVB** | *Trachycephalus resinifictrix* är nattaktiv och kan både leva och fortplanta sig utan UVB, men ungdjur som växer upp med UVB blir större och får ett friskare skelett än ungdjur utan. Därför rekommenderas ett svagt UVB-ljus. |
| **UTFODRING** | *T. resinifictrix* är glupsk och sällan kräsen. Syrsor kan utgöra största delen av kosten, och de ska vara ungefär så långa som grodans huvud är brett. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | *T. resinifictrix* är inget djur att hantera. Huden är genomsläpplig och känslig för olja och salter från människohud, och hudsekretet kan irritera. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Brasilien, Franska Guyana, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Peru och Ecuador. |