herpy

GRODOR

Milk Frog

Trachycephalus typhonius

Trachycephalus typhonius är en stor, nattaktiv trädgroda med knölig hud och gyllene ögonkanter. Den lever över ett enormt område från Mellanamerika till norra Argentina, från regnskog till savann och trädgårdar. Huden avger ett vitt sekret som svider i slemhinnor, och skötselerfarenheterna är få.

Familj: Hylidae Tidigare namn: *Phrynohyas venulosa* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-8 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann, torrskog och regnskog**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Ägg per läggning	**100-1 500**
Kläckning	**1-2 dagar**
Larvtid	**21-75 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Skötseln av *Trachycephalus typhonius* bygger på den nära besläktade *Trachycephalus resinifictrix*, som är en likaledes stor, nattaktiv trädgroda.

TEMPERATUR
Håll terrariet på 24-28 °C på dagen och 18-22 °C på natten. Det finns ingen vintervila. Grodan tål en kortvarig avvikelse, men temperaturen får inte ligga över 30 °C under längre tid.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ska ligga på 60-90 % med en stegring efter sprutning. Arten lever också i torra biotoper och är härdig, så luften behöver inte vara mättad hela tiden.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Ställ in en stor, stabil vattenskål i terrariet. Skålen ska vara så stor att grodan kan sitta i den, och vattnet ska vara lågt så att djuret lätt kan ta sig upp igen.

LJUS OCH UVB
Ge 10-12 timmars ljus per dag, först och främst för växternas skull. Grodan sover på dagen och är mest aktiv i mörker, så den behöver inte starkt ljus. En låg nivå av UVB hjälper grodan att ta upp kalken i födan.

UTFODRING
Grodan tar det mesta den kan klara av: syrsor, stugflugor, spyflugor, kackerlackor, maskar och andra insekter. Syrsor kan utgöra huvuddelen av kosten, och de andra foderdjuren ges växelvis.

BETEENDE OCH HANTERING
Trachycephalus typhonius är nattaktiv och sover på dagen i gömställen, ofta högt uppe, medan den blir aktiv när ljuset släcks.

NATURLIG UTBREDNING
Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Trinidad och Tobago, Guyana, Surinam, Franska Guyana, Brasilien, Bolivia, Paraguay och Argentina.