herpy

KAMELEONTER

Furcifer lateralis

Furcifer lateralis är en liten, färgrik kameleont från Madagaskars skogar, snår och trädgårdar. Honan är särskilt starkt tecknad, framför allt när hon är dräktig. Arten blir bara 17-25 cm, könsmognar på få månader och lever bara 2-3 år, och dess blygsamma storlek gör den till en överkomlig kameleont för den erfarne hållaren.

Familj: Chamaeleonidae Engelska: Carpet Chameleon Tidigare namn: *Chamaeleo lateralis; Chamaeleo lambertoni* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**17-25 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**2-3 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann och regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-100 %**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**3-6 mån.**
Kullstorlek	**6-23 ägg**
Kullar per år	**3-6**
Inkubation	**150-400 dagar** vid 20-25 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 45 × 45 × 60 cm (längd × bredd × höjd).
TEMPERATUR	Dagstemperaturen ska vara 24-29 °C. Använd en solplats på 32-35 °C, mätt som yttemperatur med en IR-termometer, och låt den övre delen av terrariet ligga på 27-29 °C och skuggiga platser och bottnen på 21-24 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara 60-100 %. Terrariet får gärna torka ut under dagen, så länge luften är relativt fuktig och djuret kan dricka dagligen.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och solälskande, så den kräver kraftigt ljus och UVB. Använd ett T5 HO-rör med 6500 K för ljus och ett UVB-rör som ger Ferguson-zon 3 på solplatsen.
UTFODRING	*F. lateralis* är ren insektsätare. Bytet ska vara ungefär lika långt som avståndet mellan ögonen. Mjölmaskar får gärna vara längre. Variera födan: syrsor, mjölmaskar, superormar, kackerlackor, bananflugor och bönborrar.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten hålls enskilt. Hanarna är aggressiva och revirhävdande, och honorna stressas lätt. Djuren kan bita varandra, så parning ska övervakas, och djuren skiljas åt när parningen är över.
NATURLIG UTBREDNING	Madagaskar.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/kamaeleoner/furcifer-lateralis