herpy

KAMELEONTER

Furcifer minor

Furcifer minor är en liten kameleont från Madagaskars centrala högland. Hanen är beige och brun med två nosutskott, medan honan är den färgrika, särskilt när hon bär ägg. Arten blir 16-23 cm totalt, är hotad i naturen och är sällsynt i fångenskap. Den kräver en hållare med erfarenhet av kameleonter, särskilt eftersom honorna lätt får problem med äggläggningen.

Familj: Chamaeleonidae Engelska: Lesser Chameleon Tidigare namn: *Chamaeleo minor* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**16-23 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**2-4 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann, torrskog och bergsskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Värmeplats	**32-38 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**60-100 %**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**5-9 mån.**
Kullstorlek	**4-18 ägg**
Kullar per år	**1-3**
Inkubation	**190-270 dagar** vid 22-24 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 45 × 45 × 60 cm (längd × bredd × höjd). Arten är liten och kräver inte ett stort terrarium, men vissa djur är mer rastlösa och trivs bättre med mer utrymme.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen ska vara 21-26 °C. Använd en solplats på 32-38 °C, mätt som yttemperatur med en IR-termometer, och låt bottnen ligga svalare.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på 60-100 %. Arten kommer från ett område med hög luftfuktighet, men terrariet ska torka ut under dagen för att undvika stillastående vatten och sjukdomar.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och solälskande och kräver kraftigt ljus. Använd ett T5-rör med 6500 K för ljus och ett UVB-rör som ger Ferguson-zon 3 på solplatsen. Zonen är lånad från *Furcifer pardalis*.
UTFODRING	*F. minor* är ren insektsätare. Ge ett varierat urval: syrsor, kackerlackor, bönborrar och bananflugor. Små insekter förbises ofta av vuxna djur i början, men kameleonter äter naturligt många små insekter under dagen.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten hålls enskilt, och bara för parning sätts två djur ihop. Djuren är aggressiva mot artfränder, också ungarna, och de kan skada varandra allvarligt. Mot hållaren är arten lugnare och biter sällan.
NATURLIG UTBREDNING	Madagaskar.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/kamaeleoner/furcifer-minor