herpy

KAMELEONTER

Trioceros hoehnelii

Trioceros hoehnelii är en liten, levandefödande kameleont från de svala högländerna i Kenya och Uganda, där nätterna kan närma sig fryspunkten. Hanen har en hög hjälm och ett horn på nosen. Arten är robust mot kyla, men tål värme dåligt, så den kräver ett svalt terrarium med ett tydligt temperaturfall på natten och hög nattfuktighet.

Familj: Chamaeleonidae Engelska: Von Hoehnel's Chameleon Tidigare namn: *Chamaeleo hoehnelii; Chamaeleo bergeri; Chamaeleo leikipiensis* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**18-25 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**15-70 g**
Livslängd	**5-6 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Bergsskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**20-22 °C**
Värmeplats	**24-25 °C**
Temperatur, natt	**8-14 °C**
Luftfuktighet	**50-100 %**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**12 mån.**
Kullstorlek	**4-22 ungar**
Kullar per år	**1-2**
Dräktighet	**120-180 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett fullvuxet djur ska ha ett terrarium på minst 60 × 45 × 90 cm (längd × bredd × höjd). Måttet är lånat från liknande små bergskameleonter av släktet *Trioceros* och är ett minimum.

TEMPERATUR
Arten kommer från svalt höglandet och tål värme dåligt. Dagstemperaturen i terrariet ska vara 20-22 °C, och solplatsen får inte vara varmare än 24-25 °C. Unga djur kan dö om temperaturen kommer högre upp.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Natten är artens fuktiga tid. Luftfuktigheten ska stiga mot 100 % på natten, med dimma från en ultraljudsfuktare i omkring tre timmar sent på natten och tidigt på morgonen.

LJUS OCH UVB
Arten är dagaktiv och använder mycket ljus. Ge 12 timmars ljus per dag året runt. Ett T5 HO-rör med 6500 K eller en kraftig LED-lampa över terrariets bredd ger det vanliga ljuset. UVB är nödvändigt.

UTFODRING
T. hoehnelii är insektsätare och tar de flesta insekter av lämplig storlek. Ge syrsor, små gräshoppor, flugor, kackerlacknymfer och andra småinsekter, och håll bytet på högst avståndet mellan djurets ögon.

BETEENDE OCH HANTERING
Arten hålls enskilt. Hanarna är mycket aggressiva mot varandra och mot liknande arter: de fräser, blåser upp sig och blir svarta, så hanar får inte kunna se varandra.

NATURLIG UTBREDNING
Kenya och Uganda.