herpy

KAMELEONTER

Mellers kameleont

Trioceros melleri

Trioceros melleri är den största kameleonten på det afrikanska fastlandet. Den blir upp till 60 cm lång, har ett enda litet horn på nosen och lever i buskrika savanner och glesa skogar i Tanzania, Malawi och Moçambique. Arten kräver mycket utrymme, gott om vatten och svala, fuktiga nätter och passar bara hos en erfaren hållare.

Familj: Chamaeleonidae Engelska: Meller's Chameleon Tidigare namn: *Chamaeleo melleri; Ensirostris melleri* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-60 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**300-500 g**
Livslängd	**5-14 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann och torrskog**
Svårighetsgrad	**Expert**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 90 × 150 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**40-100 %**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**15-80 ägg**
Kullar per år	**1**
Inkubation	**180-270 dagar** vid 24-26 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 120 × 90 × 150 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre. Arten blir stor och tung, och ett helt rum eller en stor voljär är inte för mycket.

TEMPERATUR

Dagstemperaturen i terrariet ska vara 22-28 °C, och på solplatsen under lampan 29-32 °C. Uppgifterna för dagen varierar från 22-25 till 27-29 °C. Den varma änden passar bäst för djur från Tanzanias kust.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska följa dygnet: 40-50 % på dagen och över 90 % på natten. Konstant fukt ger luftvägsinfektioner och svampar, så alla ytor ska torka upp under dagen. Se till att luften rör sig när fuktigheten är hög.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och behöver kraftigt ljus 12 timmar per dygn. Använd ett T5 HO-UVB-rör i en enkelreflektor över terrariets längd, och komplettera med fullspektrum- eller växtljus så att växterna trivs.

UTFODRING

T. melleri är insektsätare. Ge varierad, stor föda: syrsor, gräshoppor, kackerlackor, silkesmaskpuppor, vandrande pinnar och svarta soldatflugelarver.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten hålls ensam hela livet. Hanar är starkt revirhävdande, och även ett par i ett stort terrarium ger problem. Två djur förs bara samman kortvarigt för parning. Honan är något mildare men inte heller lämpad för grupphållning.

NATURLIG UTBREDNING

Malawi, Moçambique och Tanzania.