herpy

KAMELEONTER

Trioceros quadricornis

Trioceros quadricornis är en medelstor kameleont från de svala bergsskogarna i Kamerun och sydöstra Nigeria. Hanen har flera horn på nosen och en hög segelkam på ryggen. Arten är skygg, tål värme och torka dåligt, och många djur i handeln är vildfångade, så den passar den erfarne hållaren.

Familj: Chamaeleonidae Engelska: Four-horned Chameleon Tidigare namn: *Chamaeleo quadricornis; Chamaeleo eisentrauti; Trioceros eisentrauti* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-37 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**3-7 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Bergsskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 60 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, natt	**13-18 °C**
Luftfuktighet	**50-100 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**6 mån.**
Kullstorlek	**8-15 ägg**
Kullar per år	**2-4**
Inkubation	**120-150 dagar** vid 20-23 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur behöver ett nätterrarium på minst 60 × 60 × 90 cm (längd × bredd × höjd), och gärna upp till 120 cm högt. Större är alltid bättre.

TEMPERATUR

Arten är en köldkrävande bergsart. Dagstemperaturen ska vara 20-25 °C, och 22-25 °C är idealiskt. På natten ska temperaturen sjunka omkring 5 °C till 13-18 °C, och den får inte hållas uppe med lampor eller värmemattor.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara minst 50 % och helst 70 % eller mer på dagen och stiga mot 100 % på natten. Är fuktigheten varaktigt låg torkar djuret ut och får njur- och luftvägssjukdomar.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv. UVB-lysrör är det bästa huvudljuset, och en liten glödlampa räcker som solplats. Naturligt solljus utan glas är en stor fördel, eftersom vanligt fönsterglas filtrerar bort UVB.

UTFODRING

Trioceros quadricornis är insektsätare. Ge så varierad föda som möjligt: små nattfjärilar, flugor, sniglar, gråsuggor, syrsor och mjölmaskar av arten superorm. Nattfjärilar, flugor och sniglar avvisas sällan.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten hålls ensam. Samhusning ger stress, och honor kan dö av luftvägsinfektion eller sluta äta. Arten är skygg och drar sig undan, och den hanteras så lite som möjligt.

NATURLIG UTBREDNING

Kamerun och Nigeria.