herpy

KAMELEONTER

Plated Leaf Chameleon

Brookesia stumpffi

Brookesia stumpffi är en liten, bladliknande kameleont från skogsbotten i norra och nordvästra Madagaskar. Den blir upp till omkring 9 cm, har en rad taggar längs varje sida av ryggen och byter bara lite färg. Den lägger 2-5 ägg och kan hållas i par. Den kräver hög luftfuktighet, ett tjockt lövlager och mycket små foderdjur till ungarna.

Familj: Chamaeleonidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-9 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**3-4 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**18-20 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**5 mån.**
Kullstorlek	**2-5 ägg**
Inkubation	**45-70 dagar** vid 18-23 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par behöver ett terrarium på minst 40 × 30 × 40 cm (längd × bredd × höjd). Måttet är en uppskattning utifrån djurets storlek, och en hane med flera honor behöver mer plats.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen är 22-25 °C, och på natten är 18-20 °C lämpligt. Det motsvarar klimatet i lövlagret i utbredningsområdet. Arten behöver ingen varm solplats, och en svag värmekälla i den ena änden räcker.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara 70-100 %, så att den håller sig hög i lövlagret hela dygnet. Duscha terrariet 1-2 gånger om dagen, så att löv och växter är fuktiga, men så att ytorna är torra igen innan nästa duschning.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv. Ett svagt UVB-ljus motsvarande Ferguson-zon 1 räcker, och djuret ska alltid kunna dra sig undan i skugga.

UTFODRING

Brookesia stumpffi äter små insekter som syrsor, bananflugor, kackerlackor, vaxmal och små gräshoppor. Foderdjuren ska vara små, och ungarna matas med hoppstjärtar, bananflugor och nykläckta syrsor.

BETEENDE OCH HANTERING

B. stumpffi är lugn och dagaktiv och går långsamt omkring i lövet. Hotad låter den sig falla och ligger stilla som ett dött blad. Det är ett naturligt försvarsbeteende och inte tecken på sjukdom.

NATURLIG UTBREDNING

Madagaskar.