herpy

KAMELEONTER

Flap-necked Chameleon

Chamaeleo dilepis

Chamaeleo dilepis är en medelstor, trädlevande kameleont från savanner, buskmarker och glesa skogar i stora delar av Afrika söder om Sahara. Den känns igen på de två hudflikarna bakom huvudet och på ett vitt streck längs sidan. Arten är härdig för att vara en kameleont, men nästan alla djur i handeln är vildfångade. Den behöver ett högt nätterrarium med UVB, dricker bara droppar och ska bo ensam.

Familj: Chamaeleonidae Tidigare namn: *Chamaeleo angusticoronatus; Chamaeleo bilobus; Chamaeleo capellii; Chamaeleo isabellinus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-35 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**3-8 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann och torrskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**20-75 ägg**
Kullar per år	**1-3**
Inkubation	**300-365 dagar** vid 27-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett fullvuxet djur behöver ett nätterrarium på minst 60 × 45 × 90 cm (längd × bredd × höjd). För en stor hona är 60 × 60 × 90 cm bättre, och större är alltid en fördel. Ungdjur kan hållas i 40 × 40 × 75 cm.

TEMPERATUR

På dagen ska temperaturen i terrariet vara 25-30 °C, och på en solgren ska det vara 32-35 °C. Börja med en 60 W-lampa och justera efter mätningen: en för stark lampa kan ge allvarliga brännskador, även genom nätet.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara omkring 50-60 %, och efter besprutning får den gärna komma upp mot 70 %, så länge terrariet torkar igen. Växter hjälper till att hålla fukten.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och solälskande och ska ha kraftigt ljus i 12 timmar och mörker i 12 timmar. Fullspektrumljus och UVB är nödvändiga, eftersom djuret bildar D3 i huden och behöver den för att ta upp kalk.

UTFODRING

Arten äter insekter: syrsor, gräshoppor, kackerlackor (t.ex. *Blaptica dubia*), silkesmaskar, hornmaskar, svarta soldatflugor och deras larver, och i mindre mängd mjölmaskar och vaxmottlarver, som är feta.

BETEENDE OCH HANTERING

Chamaeleo dilepis är mild och lugn jämfört med många andra kameleonter, men det är ett djur man tittar på, inte ett man tar upp. Hantering stressar och får bara ske när det är nödvändigt.

NATURLIG UTBREDNING

Etiopien, Somalia, Sydsudan, Kenya, Tanzania, Moçambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Sydafrika, Eswatini, Lesotho, Angola, Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville, Gabon, Ekvatorialguinea, Kamerun, Nigeria, Togo, Burundi och Rwanda.