herpy

KAMELEONTER

Böhme's Two-horned Chameleon

Kinyongia boehmei

Kinyongia boehmei är en liten, grön bergskameleont som bara finns i Taitabergen i sydöstra Kenya. Hanen har två platta, nästan parallella nöshorn, medan honan saknar horn. Arten lägger ägg och kräver ett svalt, fuktigt klimat och ett högt, tätt planterat terrarium. Skötseln är bara lite dokumenterad, och arten passar bäst för erfarna hållare.

Familj: Chamaeleonidae Tidigare namn: *Bradypodion tavetanum boehmei; Kinyongia tavetana boehmei*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-19 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**6-8 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Bergsskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Värmeplats	**28 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**12 mån.**
Kullstorlek	**2-11 ägg**
Inkubation	**180-360 dagar** vid 18-22 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Skötseln av *Kinyongia boehmei* är bara lite dokumenterad, och flera av siffrorna här är uppskattade utifrån klimatet i Taitabergen.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 22-26 °C med en solplats på cirka 28 °C, och temperaturen får inte överstiga 28 °C. På natten ska den sjunka till 15-20 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara 60-80 %. Djuret dricker droppar och klarar sig inte med en vattenskål: använd ett dropp- eller regnsystem, eller spraya bladen flera gånger om dagen.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och behöver 12-14 timmars ljus per dygn med fullspektrumljus och UVB. Ferguson-zon 2 är en uppskattning för en bergskameleont.
UTFODRING	*Kinyongia boehmei* äter uteslutande insekter. Bra foderdjur är små syrsor, gräshoppor, husflugor och bananflugor, med mjölmaskar och vaxmottlarver då och då.
BETEENDE OCH HANTERING	*Kinyongia boehmei* är territoriell och stressas av hantering och av synen av artfränder. Hanarna visar upp sig med hornen och med färgförändringar. Ta inte upp djuret utan anledning.
NATURLIG UTBREDNING	Kenya.