herpy

KAMELEONTER

Usambara Soft-horned Chameleon

Kinyongia tenuis

Kinyongia tenuis är en liten, smal kameleont från Usambarabergen i Tanzania och Shimba Hills i Kenya. Den är brun och grå med lång svans och långa ben och lever högt uppe i fuktig, sval regnskog. Arten lägger ägg. Den är sällsynt i fångenskap, och skötseln är bara sparsamt beskriven.

Familj: Chamaeleonidae Tidigare namn: *Bradypodion tenue; Kinyongia tenue; Chamaeleo tenuis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-7 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Värmeplats	**26-28 °C**
Temperatur, natt	**14-18 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**9-12 mån.**
Kullstorlek	**12-20 ägg**
Inkubation	**240-330 dagar** vid 17-23 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Arten är sällsynt i fångenskap, och skötseln är bara sparsamt beskriven. Guiden här bygger på klimatet i utbredningsområdet och på de bättre kända arterna från samma område, *Kinyongia fischeri* och *Trioceros deremensis*.

TEMPERATUR

På dagen ska det vara 20-25 °C med en måttlig solplats på 26-28 °C, och på natten ska temperaturen sjunka till 14-18 °C. Värme över 30 °C ska undvikas. Håll luften i rörelse, så att den inte blir stillastående.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara hög, 70-100 %, och högst på natten och morgonen. Djuret dricker droppar och ska inte ha vattenskål.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och ska ha ett ljust, men inte för varmt terrarium. UVB rekommenderas, och Ferguson-zon 2 är en uppskattning för en skogskameleont.

UTFODRING

Kinyongia tenuis äter insekter. Syrsor, kackerlackor, silkesmaskar och små gräshoppor i lagom storlek är lämpliga, som hos de besläktade arterna. Foderdjuren ska vara uppfödda och ha fått näringsrikt foder (gut-load).

BETEENDE OCH HANTERING

Kameleonter stressas lätt av hantering, och det gäller sannolikt också *Kinyongia tenuis*. Ta inte upp djuret utan anledning. Arten söker sig högt upp och ska ha sina fasta sovgrenar i den översta delen av terrariet.

NATURLIG UTBREDNING

Kenya och Tanzania.