herpy

KAMELEONTER

Spectral Pygmy Chameleon

Rhampholeon spectrum

Rhampholeon spectrum är en liten, bladlik kameleont på 7-10 cm från skogsbotten i Väst- och Centralafrika. Den är grönbrun till grå som ett dött blad, med två sneda mörka strimmor på sidorna och en liten, mjuk hudflik på nosen. Den hålls i ett litet, fuktigt och tätt planterat terrarium med ett tjockt lövlager. Skötseln är bara lite känd, så siffrorna bygger på nära släktingar.

Familj: Chamaeleonidae Tidigare namn: *Brookesia spectrum; Chamaeleo spectrum; Rhampholeon affinis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-10 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**2-4 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**70-95 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**3-9 mån.**
Kullstorlek	**2-5 ägg**
Inkubation	**150-210 dagar** vid 18-23 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Rhampholeon spectrum*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen ska vara 20-25 °C och nattemperaturen 16-20 °C. Fallet på natten kommer av sig självt när lamporna släcks.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på 70-95 % på dagen och 80-95 % på natten. Spraya terrariet ordentligt minst två gånger om dagen, på morgonen och igen på kvällen, med ljumt vatten.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och lever i skugga, så ljuset ska likna skogens dämpade ljus.
UTFODRING	Arten äter små insekter och andra leddjur: bananflugor, små syrsor, bönbaggar, kornvivlar, små kackerlackor och hoppstjärtar till de yngsta. Bytet får högst vara omkring 20 % av djurets kroppslängd.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten hålls enskilt. Aggressionen mellan artfränder är låg, men två djur tillsammans stressar lätt det underlägsna djuret, så de sätts ihop bara för parning.
NATURLIG UTBREDNING	Kamerun, Kongo-Brazzaville, Ekvatorialguinea, Centralafrikanska republiken, Gabon och Nigeria.