herpy

KAMELEONTER

Jacksons kameleont

Trioceros jacksonii

Trioceros jacksonii är en medelstor kameleont från bergsskogarna i Kenya och Tanzania. Hanen bär tre framåtriktade horn, och honan föder levande ungar i stället för att lägga ägg. Arten kräver svala nätter, hög nattfuktighet och noggrann skötsel, så den är mest för den erfarne ägaren.

Familj: Chamaeleonidae Engelska: Jackson's Chameleon Tidigare namn: *Chamaeleo jacksonii; Chamaeleon jacksonii*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-38 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-9 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Bergsskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 60 × 120 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Värmeplats	**27-30 °C**
Temperatur, natt	**10-15 °C**
Luftfuktighet	**40-100 %**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**5-12 mån.**
Kullstorlek	**8-30 ungar**
Dräktighet	**150-180 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett fullvuxet djur ska ha ett terrarium på minst 60 × 60 × 120 cm (längd × bredd × höjd). Höjden är viktigare än bottenytan, eftersom arten använder hela höjden.

TEMPERATUR
Arten är ett högländskt djur och tål värme dåligt. Dagstemperaturen i terrariet ska vara 20-24 °C. På solplatsen under lampan ska det vara 27-30 °C. Tecken på värmestress syns redan när hela terrariet kommer över 27 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Luftfuktigheten ska följa artens dygnsrytm: omkring 90-100 % på natten och 40-50 % på dagen. Konstant 60-80 % är inte korrekt och kan göra djuret sjukt. Alla ytor ska vara torra under dagen.

LJUS OCH UVB
Arten är dagaktiv och kräver mycket ljus. Ett T5 HO-rör med 6500 K eller en kraftig LED-lampa över hela terrariets bredd ger ljuset. Dagslängden är 12 timmar hela året, eftersom Kenya ligger nära ekvatorn. UVB är nödvändigt.

UTFODRING
T. jacksonii är insektsätare. Bytet får högst vara lika stort som avståndet mellan ögonen. Variera födan: gräshoppor, syrsor, kackerlacknymfer, flugor och små skalbaggar.

BETEENDE OCH HANTERING
Arten hålls enskilt hela livet. Hanar är territoriella och bör aldrig kunna se varandra. Två djur förs bara samman när en hona förs till en hane för parning.

NATURLIG UTBREDNING
Kenya och Tanzania.