herpy

KOPPARÖDLOR

Fringed Arboreal Alligator Lizard

Abronia fimbriata

Abronia fimbriata är en brun, trädlevande ödla med taggliknande fjäll ovanför örat från dimskogarna i Guatemalas nordöstra högland. Den blir omkring 25-35 cm, föder levande ungar och äter insekter. Den kräver ett högt, luftigt terrarium med mossa och bromelior och svala temperaturer. Arten är hotad, och skötseln är bara sparsamt beskriven.

Familj: Anguidae Tidigare namn: *Barissia fimbriata; Gerrhonotus fimbriatus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**25-35 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Bergsskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 50 × 75 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-27 °C**
Värmeplats	**26-30 °C**
Temperatur, natt	**10-18 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**24-36 mån.**
Kullstorlek	**4 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**180-240 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga I**
EU-bilaga	**Bilaga A**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Skötseln av *Abronia fimbriata* är bara sparsamt beskriven, och uppgifterna här är lånade från den nära släktingen *Abronia graminea*, som är den bäst kända arten i släktet.

TEMPERATUR

Abronia fimbriata tål inte värme. Dagstemperaturen ska ligga på 20-27 °C, och solplatsen under en svag spotlampa får vara 26-30 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Den relativa luftfuktigheten ska ligga på 60-80 %, med de högsta värdena på natten och efter sprayning. Spraya växter, väggar och djuren lätt nästan varje dag, gärna med en tryckspryare eller ett dimsystem som ger fin dimma.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och behöver UVB. Bäst är naturligt, ofiltrerat solljus, till exempel i en nätlåda utomhus i torrt väder på sommaren med skugga och svalt underlag, så att djuret kan flytta sig.

UTFODRING

Abronia fimbriata lever av insekter och andra smådjur. Ge syrsor, gräshoppor, mjölmaskar, kackerlackor, sniglar, spindlar och mjuka larver, till exempel gröna fjärilslarver och fluglarver med högt kalkinnehåll.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är tyst och skygg. Djuret tillbringar största delen av dagen sittande stilla på en gren eller i en bromelia och solar sig under korta perioder. Det är inte ett djur som ska hanteras.

NATURLIG UTBREDNING

Guatemala.