herpy

KOPPARÖDLOR

kopparorm

Anguis fragilis

Anguis fragilis är en benlös, blank ödla på 40-50 cm som lever gömd under stenar, trä och tät vegetation i västra och centrala Europa. Den liknar en orm, men har ögonlock och kan kasta svansen. Den lever av sniglar och daggmaskar, föder levande ungar och kan bli mycket gammal. Den kräver ett svalt, fuktigt terrarium eller utomhusanläggning med djup botten, många gömställen och en riktig vintervila.

Familj: Anguidae Engelska: Slow Worm

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**40-50 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**20-100 g**
Livslängd	**20-30 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Värmeplats	**25-30 °C**
Temperatur, natt	**10-15 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Vintervila	**4-8 °C** 16-20 veckor
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**36-48 mån.**
Kullstorlek	**6-12 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**80-100 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Skötseln av *Anguis fragilis* är bara sparsamt beskriven, men arten är härdig och förökar sig villigt när förhållandena är rätt. Uppgifterna här bygger på artens levnadssätt och klimat.
TEMPERATUR	Arten tål inte stark värme. Dagstemperaturen ska ligga på 18-24 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara 60-80 %. Botten ska vara lätt fuktig på djupet, men aldrig blöt, och den översta delen får gärna torka lite mellan varje sprayning. Spraya lätt varje eller varannan dag, och håll mossan fuktig.
LJUS OCH UVB	Arten är mest aktiv på morgonen och i skymningen och solar sig mest indirekt.
UTFODRING	*Anguis fragilis* lever av långsamma bytesdjur och föredrar små, grå åkersniglar framför allt annat. Den tar också andra nakna sniglar, daggmaskar, harkrankslarver, fluglarver, spindlar och små snäckor med hus.
BETEENDE OCH HANTERING	*Anguis fragilis* är lugn och tillbringar större delen av tiden i botten eller under gömställen, ofta med bara huvudet stickande upp.
NATURLIG UTBREDNING	Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Schweiz, Liechtenstein, Österrike, Tjeckien, Polen, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien och Nordmakedonien.