herpy

KOPPARÖDLOR

Iberian Worm Lizard

Blanus cinereus

Blanus cinereus är en benlös masködla från Iberiska halvön som lever hela livet under jorden i lös, mullrik jord och under stenar. Djuret är 15-25 cm från nos till kloak och har en ringdelad kropp, rundad nos och nästan blinda ögon. Arten lägger 1-2 ägg per år och kräver en djup, lätt fuktig botten, jämn värme underifrån och lugn och ro. Det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Blanidae Tidigare namn: *Amphisbaena cinerea; Blanus mariae*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-25 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Grävande**
Biotop	**Tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Expert**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-3 ägg**
Kullar per år	**1**
Inkubation	**60-90 dagar** vid 22-26 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Blanus cinereus*.
TEMPERATUR	Djuren värmer sig genom att ligga nergrävda i uppvärmd jord, inte i ljusets värme. Botten ska vara 20-24 °C på dagen, något varmare i den ena änden än i den andra.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Det är bottnens fukt som räknas, inte luftens. Botten ska vara svagt till måttligt fuktig, inte blöt: den ska kunna hålla en form när den pressas i handen, utan att klibba eller droppa. Spraya botten lätt med vatten varje dag.
LJUS OCH UVB	Djuren ligger nergrävda och syns inte i ljuset. UVB är inte nödvändigt.
UTFODRING	*Blanus cinereus* äter insekter och insektslarver. Mjölmaskspuppor och -larver och små, nyligen avlivade syrsor, pudrade med ett multivitaminpulver, är lämpligt foder. Lägg föda under plattan tre gånger i veckan.
BETEENDE OCH HANTERING	*Blanus cinereus* ses sällan. Djuren ligger nergrävda och kommer bara fram under plattan. Det är normalt. Gräv inte efter djuren för att kontrollera dem: stress får dem att röra sig mindre och använda en mindre yta.
NATURLIG UTBREDNING	Spanien, Portugal och Gibraltar.