herpy

KOPPARÖDLOR

## Wiegmann's Alligator Lizard

# *Gerrhonotus liocephalus*

*Gerrhonotus liocephalus* är en kraftig, brunaktig ödla med ljusa tvärband från skog och buskmark i södra Mexikos högland. Den blir 30-50 cm, är dagaktiv, klättrar bra och lägger ägg. Det finns bara lite kunskap om skötseln av just den här arten, och det mesta bygger på den nära släktingen *Gerrhonotus infernalis* från Texas och nordöstra Mexiko.

Familj: Anguidae

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **30-50 cm**<br>total längd inkl. svans |
| Livslängd | **10-15 år** |
| Aktiv | **På dagen** |
| Levnadssätt | **Trädlevande och marklevande** |
| Biotop | **Bergsskog** |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **90 × 60 × 60 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **24-29 °C** |
| Värmeplats | **35-40 °C** |
| Temperatur, natt | **15-21 °C** |
| Luftfuktighet | **40-70 %** |
| Vatten | **Vattenskål** |
| UVB | **Rekommenderas**<br>Fergusonzon 2 |
| Föda | **Insekter och maskar/sniglar** |
| Hålls | **Ensamma eller parvis** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Könsmogen | **18-36 mån.** |
| Kullstorlek | **5-31 ägg** |
| Kullar per år | **1** |
| Inkubation | **50-70 dagar**<br>vid 24-26 °C |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ej listad** |
| EU-bilaga | **Ej listad** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Gerrhonotus liocephalus*. |
| **TEMPERATUR** | Luften i terrariet ska ligga på 24-29 °C på dagen, med en solplats på 35-40 °C under halogenspotlights, där djuret kan värma sig. På natten ska det vara svalare, omkring 15-21 °C. Mät med digitala termometrar. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN** | Luftfuktigheten ska vara måttlig, omkring 40-70 %, med högre fuktighet i gömslena. Siffran är en uppskattning utifrån klimatet. |
| **LJUS OCH UVB** | Arten är dagaktiv och behöver kraftigt ljus och UVB. Använd ett T5 HO-rör för UVB, så att UV-indexet går från 0 till 3 genom terrariet, motsvarande Ferguson-zon 2, och så att djuret kan söka sig ut ur UV-ljuset. |
| **UTFODRING** | *Gerrhonotus liocephalus* lever av insekter och andra smådjur och jagar aktivt. Ge en varierad kost av syrsor, kackerlackor, gräshoppor, vandrande pinnar, gråsuggor, snäckor, spindlar, flugpuppor, skalbaggar och larver. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | Arten är skygg men nyfiken och kan bli mycket lugn. Den solar sig på grenar och stenar och jagar genom att smyga sig på bytet, böja framkroppen i en S-form och slå till. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Mexiko. |