herpy

KOPPARÖDLOR

Gilaödla

Heloderma suspectum

Heloderma suspectum är en kraftig, långsam ödla från öknarna i sydvästra USA och nordvästra Mexiko, svart med skära eller gula band och täckt av pärlformade fjäll. Den är giftig: ett bett är ett akut medicinskt nödläge, och arten kräver erfarenhet, fasta rutiner och säker hantering. Den blir 35-55 cm, gräver, lever av ägg och små ryggradsdjur och kan bli över 20 år.

Familj: Helodermatidae Engelska: Gila Monster

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**35-55 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**500-800 g**
Livslängd	**20-30 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Klipplevande, marklevande och grävande**
Biotop	**Öken, halvöken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Expert**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**150 × 70 × 50 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Vintervila	**10-15 °C** 13-17 veckor
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**36-60 mån.**
Kullstorlek	**3-7 ägg**
Kullar per år	**1**
Inkubation	**134-155 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 150 × 70 × 50 cm (längd × bredd × höjd). Måttet är en uppskattning utifrån djurets storlek och levnadssätt.
TEMPERATUR	På dagen ska terrariet ha en gradient från 22 °C i den svala änden till 32 °C under värmelampan, så att djuret själv kan välja. Aktiva djur håller en kroppstemperatur omkring 30 °C. På natten faller temperaturen till 20-24 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ligger på 40-60 %, och en del av bottnen hålls lätt fuktig, så att djuret kan gräva ner sig i fuktigare jord.
LJUS OCH UVB	Arten är aktiv på dagen och i skymningen. Ljuset tänds 10-13 timmar per dag, kortast under perioderna före och efter vintervilan och släckt under den. UVB rekommenderas: en UVB-spotlight eller ett UVB-rör vid värmeplatsen.
UTFODRING	I naturen tar arten små däggdjur, ungar från bon, fåglar, ödlor, ormar, grodor och insekter och framför allt ägg från fåglar och kräldjur. Den äter få, stora måltider om året och lever av fettet i svansen och bukhålan.
BETEENDE OCH HANTERING	SÄKERHET: djuret är giftigt, och det största felet är att lita på att det är långsamt och tamt. Ett bett kommer utan förvarning, även från ett djur som tagit foder från pincetten i åratal.
NATURLIG UTBREDNING	USA och Mexiko.