herpy

KOPPARÖDLOR

Eastern Glass Lizard

Ophisaurus ventralis

Ophisaurus ventralis är en lång, benlös glasödla från kustslätterna i sydöstra USA. Den blir upp till omkring 108 cm, varav över två tredjedelar är svans, och lever gömd i fuktiga, sandiga skogar och ängar. Den liknar en orm. Den kräver ett rymligt terrarium med djupt, grävbart bottensubstrat, en varm plats och varierad föda av insekter, snäckor och daggmaskar.

Familj: Anguidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**45-108 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**4-15 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Savann och våtmark**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-29 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-75 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Vintervila	**12-16 °C** 6-10 veckor
Föda	**Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**24 mån.**
Kullstorlek	**5-17 ägg**
Kullar per år	**1**
Inkubation	**50-65 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötsel av *Ophisaurus ventralis*, och arten hålls sällan. Siffrorna bygger på artens livsmiljö och på de övriga glasödlorna i släktet, och det framgår av texten där de är uppskattningar.

TEMPERATUR

Dagstemperaturen ska vara 22-29 °C, med en solplats på 30-32 °C mätt på ytan med en IR-termometer och omkring 24 °C i den svala änden. På natten sjunker temperaturen med 3-6 grader till 18-22 °C, och värmen släcks.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara 60-75 %. Arten lever på fuktig, sandig mark, så en del av bottensubstratet ska vara lätt fuktigt, medan resten torkar ut, så att djuret kan välja.

LJUS OCH UVB

Arten solar sig i naturen och föredrar halvskugga. Ge ett UVB-rör i Ferguson-zon 2 över solplatsen, så att djuret själv kan välja att gå in i ljuset, och ett UV-index på 2-3 vid solplatsen. Det är en uppskattning.

UTFODRING

Ophisaurus ventralis är en opportunistisk köttätare, som framför allt tar insekter och andra smådjur, men också snäckor, daggmaskar, små ormar och ägg.

BETEENDE OCH HANTERING

Ophisaurus ventralis är lugn, men tycker inte om att bli hanterad. När den blir gripen vrider den sig, kan bita och kastar lätt svansen, så lyft aldrig djuret i svansen.

NATURLIG UTBREDNING

USA.