herpy

KOPPARÖDLOR

Checkerboard Worm Lizard

Trogonophis wiegmanni

Trogonophis wiegmanni är en liten, benlös masködla från Marocko, Algeriet och Tunisien, som lever hela livet nedgrävd i sandig jord och under stenar. Djuret är 12-18 cm från nos till kloak, har en kort, konformad svans och ett rutigt mönster. Arten föder levande ungar och kräver en djup, lätt fuktig botten, jämn värme underifrån och lugn och ro. Det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Trogonophidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**12-18 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Grävande**
Biotop	**Halvöken och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Expert**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**30 mån.**
Kullstorlek	**2-5 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**120-150 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Trogonophis wiegmanni*.
TEMPERATUR	Djuren värmer sig genom att ligga nedgrävda i uppvärmd jord och inte i ljusets värme.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Det är bottnens fukt som räknas, inte luftens. Botten ska vara lätt fuktig hela vägen ned: den ska kunna hålla en form när den pressas i handen, men inte droppa. Spraya botten med vatten varje dag.
LJUS OCH UVB	Djuren ligger nedgrävda och ses inte i ljuset. UVB behövs inte.
UTFODRING	*Trogonophis wiegmanni* är en köttätare som äter insekter och andra små, jordlevande ryggradslösa djur. I naturen är insektslarver och sniglar de föredragna bytesdjuren, medan myror och gråsuggor nästan ignoreras.
BETEENDE OCH HANTERING	*Trogonophis wiegmanni* ses sällan. Djuren ligger nedgrävda och kommer bara fram under plattan. Det är normalt. Gräv inte efter djuren för att kontrollera dem, för störning och stress gör dem mindre aktiva.
NATURLIG UTBREDNING	Marocko, Algeriet och Tunisien.