herpy

LACERTIDER

Fringe-fingered Lizard

Acanthodactylus erythrurus

Acanthodactylus erythrurus är en snabb, smal ödla från Iberien och nordvästra Afrika med långa, fransiga tår, brun och grå teckning och en rödaktig svans hos ungar och honor under parningstiden. Arten blir 18-23 cm, lever av insekter och kräver ett djupt sandsubstrat, kraftigt solljus och hög värme.

Familj: Lacertidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**18-23 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-8 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Halvöken och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**100 × 50 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-35 °C**
Värmeplats	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**15-22 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 3
Vintervila	**10-15 °C** 8-12 veckor
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**10-18 mån.**
Kullstorlek	**1-8 ägg**
Kullar per år	**1-2**
Inkubation	**35-60 dagar** vid 25-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Acanthodactylus erythrurus*.
TEMPERATUR	*Acanthodactylus erythrurus* är mycket värmeälskande: aktiva vuxna djur håller i naturen en kroppstemperatur på 32-38 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på 30-50 %, som på den torra, öppna livsmiljön. Sanden ska vara torr, och bara sanden i läggkassen hålls fuktig, medan terrariet i övrigt hålls väl ventilerat.
LJUS OCH UVB	*Acanthodactylus erythrurus* är dagaktiv och solar sig mycket, så terrariet ska ha kraftigt ljus och UVB.
UTFODRING	*Acanthodactylus erythrurus* äter insekter och andra små leddjur, i naturen framför allt myror.
BETEENDE OCH HANTERING	*Acanthodactylus erythrurus* är snabb, vaksam och skygg. Den gräver ner sig i sanden vid fara och är svår att få tag i. Undvik att gripa djuret; svansen kastas vid stress. Hanarna är revirhävdande och kämpar om platsen.
NATURLIG UTBREDNING	Spanien, Portugal, Gibraltar, Marocko och Algeriet.