herpy

LACERTIDER

Skogsödla

Zootoca vivipara

Zootoca vivipara är en liten, dagaktiv ödla som lever längre mot norr än något annat kräldjur. Arten blir omkring 15 cm och håller till på mossar, hedar, skogsbryn och ängar. I större delen av utbredningsområdet föder honan levande ungar. Den kräver ett svalt, soligt och fuktigt terrarium med många gömslen och en vintervila på tre till fyra månader.

Familj: Lacertidae Engelska: European Common Lizard

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**12-16 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**2-5 g**
Livslängd	**5-12 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Våtmark och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**80 × 50 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Värmeplats	**32-38 °C**
Temperatur, natt	**14-18 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Vintervila	**4-6 °C** 12-16 veckor
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**12-36 mån.**
Kullstorlek	**2-12 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**35-85 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Zootoca vivipara trivs bäst utomhus i en inhägnad eller en sluten trädgårdsrabatt i full sol med skuggiga, svala zoner.

TEMPERATUR

Zootoca vivipara är en art från kalla trakter, men den solar sig mycket och håller kroppstemperaturen omkring 30-33 °C när den är aktiv.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Zootoca vivipara lever i fuktiga områden, och luftfuktigheten i terrariet är 50-60 % på dagen och 70-80 % på natten. Det ska finnas en torrare och en fuktigare zon, så att djuret själv kan välja.

LJUS OCH UVB

Zootoca vivipara är dagaktiv och solar sig mycket, så den behöver solljus eller UVB. Utomhus kommer UVB från solen. Inomhus används ett UVB-rör över solplatsen, så att UV-indexet är omkring 1-3 vid djurets huvud.

UTFODRING

Zootoca vivipara är insektsätare. I naturen består kosten av flugor, spindlar, fjärilslarver, bladlöss och andra små leddjur, och honor äter mer än hanar. Djuret äter mest på soliga dagar.

BETEENDE OCH HANTERING

Zootoca vivipara är ett skyggt, snabbt och vaksamt djur. Hanarna är territoriella mot andra hanar och kan bita honan under parningstiden.

NATURLIG UTBREDNING

Irland, Storbritannien, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Spanien, Andorra, Tyskland, Schweiz, Liechtenstein, Österrike, Italien, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Grekland, Bulgarien, Rumänien, Ungern, Slovakien, Tjeckien, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Vitryssland, Ukraina, Ryssland, Kazakstan, Mongoliet, Kina och Japan.