herpy

LEGUANER

Texas horned lizard

Phrynosoma cornutum

Phrynosoma cornutum är en bred, tillplattad ödla med horn på huvudet och två rader spetsiga fjäll längs sidorna. Den lever på öppen, torr gräsmark och i snår i södra USA och norra Mexiko. Den blir 7-13 cm från nos till kloak, är dagaktiv och lever mest av myror. Just födan är det stora hindret: den är svår att ersätta, och arten är en av de svåraste ödlorna att hålla i terrarium.

Familj: Phrynosomatidae Tidigare namn: *Agama cornuta; Phrynosoma brevicornis; Phrynosoma bufonium; Phrynosoma harlanii; Phrynosoma planiceps*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-13 cm** nos-kloaklängd
Vikt	**25-90 g**
Livslängd	**7-9 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Halvöken och savann**
Svårighetsgrad	**Expert**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**100 × 50 × 40 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**27-29 °C**
Värmeplats	**38-42 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**24 mån.**
Kullstorlek	**14-37 ägg**
Kullar per år	**1**
Inkubation	**40-61 dagar** vid 27-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Phrynosoma cornutum*. Skötseln bygger därför på livsmiljön: öppen, torr mark, lös jord, stark sol och en föda av myror.

TEMPERATUR

Arten är en solälskare och behöver en solplats där ytan når 38-42 °C, mätt med en infraröd termometer. Resten av terrariet ska vara svalare, 27-29 °C på dagen, så att ödlan själv kan välja hur länge den vill ligga i värmen.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara låg, 20-40 %, och terrariet ska torka upp helt under dagen. Botten får inte vara våt. Arten dricker nästan inte ur en skål utan slickar dagg och regndroppar av växter och av sin egen kropp.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och tillbringar dagen i öppet solljus, så den behöver kraftigt ljus och UVB hela året. Använd ett UVB-rör (Ferguson-zon 3, T5 HO 10-14 %) eller en kombinerad UVB-metallhalogenlampa över solplatsen.

UTFODRING

Födan är den avgörande begränsningen. I naturen är omkring 70 % av födan skördemyror (*Pogonomyrmex*), och ungarna äter bara små myror. Resten är termiter, skalbaggar och gräshoppor.

BETEENDE OCH HANTERING

Phrynosoma cornutum är lugn och stilla och lever ensam. Den gör inte mycket väsen av sig och är lätt att förbise, eftersom den smälter samman med underlaget. Den rör sig i korta sträckor, höjer överkroppen och tittar sig omkring.

NATURLIG UTBREDNING

USA och Mexiko.