herpy

LEGUANER

Desert Spiny Lizard

Sceloporus magister

Sceloporus magister är en robust, taggig ödla från öknarna i sydvästra USA och nordvästra Mexiko. Den är dagaktiv, klättrar i träd, buskar och på klippor och lever av insekter. Hanen har blå fläckar på hals och buk. Den kräver ett stort, torrt terrarium med kraftig UVB, en mycket varm solplats och en sval vintervila. Honan lägger ägg.

Familj: Phrynosomatidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-30 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-8 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande, klipplevande och marklevande**
Biotop	**Öken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 50 × 50 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Värmeplats	**38-42 °C**
Temperatur, natt	**16-22 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Vintervila	**9-12 °C** 8-12 veckor
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**12-24 mån.**
Kullstorlek	**4-24 ägg**
Kullar per år	**1-2**
Inkubation	**60-80 dagar** vid 27-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite specifik kunskap om skötseln av *Sceloporus magister*, och den bygger på ökenklimatet och på kunskap om släktet.

TEMPERATUR

Luften ska vara 27-32 °C på dagen. Solplatsen ska ha 38-42 °C på ytan, mätt med en infraröd termometer. Arten föredrar en kroppstemperatur omkring 33 °C, och solplatsen ska vara varm nog för att den snabbt ska kunna nå den.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara låg, omkring 20-40 %. Terrariet ska vara torrt och väl ventilerat. Ställ ut en låg skål med färskt vatten, och byt vattnet dagligen. Spraya då och då terrariets sida lätt, så att djuret kan slicka droppar.

LJUS OCH UVB

Sceloporus magister är dagaktiv och solar sig, så den behöver kraftig UVB. Använd ett T5 HO-rör (Ferguson-zon 3) i en reflektor över solplatsen.

UTFODRING

Arten är insektsätare. Ge varierade levande insekter: syrsor, kackerlackor, gräshoppor, mjölmaskar, zophobas, silkesmaskar och vaxmottlarver. Foderdjuren får inte vara större än djurets huvud.

BETEENDE OCH HANTERING

Djuret är uppmärksamt, snabbt och territoriellt, och hantering stressar det. Håll hanteringen på ett minimum, och ta aldrig tag i svansen, eftersom den kan brytas av.

NATURLIG UTBREDNING

USA och Mexiko.