herpy

LEGUANER

Western fence lizard

Sceloporus occidentalis

Sceloporus occidentalis är en liten, snabb och rufsig ödla från västra USA som sitter på stenar, stammar och staket i full sol. Hanen har blå fläckar på buken och strupen, som han visar upp med armhävningar. Arten blir omkring 21 cm, är dagaktiv och lever av insekter. Den kräver en kraftig solplats, UVB, ett rymligt terrarium och ett tätslutande lock.

Familj: Phrynosomatidae Tidigare namn: *Sceloporus longipes; Sceloporus smaragdinus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**14-23 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**4-5 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande, klipplevande och marklevande**
Biotop	**Klippterräng och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**27-28 °C**
Värmeplats	**38-42 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Vintervila	**8-12 °C** 8-12 veckor
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**12-24 mån.**
Kullstorlek	**3-17 ägg**
Kullar per år	**1-3**
Inkubation	**55-65 dagar** vid 27-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av just *Sceloporus occidentalis*, så skötseln bygger på de krav som de små, solälskande arterna i släktet delar.

TEMPERATUR

På dagen ska temperaturen vara 27-28 °C. Direkt under en värmelampa ska det finnas en solplats på 38-42 °C, mätt på ytan med en infraröd termometer. Resten av terrariet ska vara svalare, så att ödlan kan välja var den vill ligga.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara måttlig, omkring 30-50 %. Arten lever i öppna, solbelysta områden och tål inte varaktig ångande fukt, men botten får heller inte vara dammtorr. Siffran är en uppskattning utifrån livsmiljön.

LJUS OCH UVB

Sceloporus occidentalis är dagaktiv och solälskande och behöver starkt ljus och UVB hela året. Använd ett UVB-rör (Ferguson-zon 3) eller en kombinerad UVB-metallhalogenlampa över solplatsen.

UTFODRING

Sceloporus occidentalis är insektsätare. I naturen äter den syrsor, spindlar, fästingar, skorpioner, myror och skalbaggar och tar då och då en mindre ödla.

BETEENDE OCH HANTERING

Sceloporus occidentalis är vaksam, snabb och revirhävdande. Hanarna visar upp sig med armhävningar, huvudnickningar och uppblåst kropp. Arten blir inte tam och lämpar sig inte för hantering.

NATURLIG UTBREDNING

USA och Mexiko.