herpy

MASKGRODDJUR

Taita African Caecilian

Boulengerula taitana

Boulengerula taitana är ett litet, benlöst maskgroddjur som bara finns i Taitabergen i sydöstra Kenya. Honan lägger få ägg i en kammare i jorden och stannar kvar hos dem, och de nykläckta ungarna lever av hennes yttersta hudlager. Arten är hotad, och skötseln i fångenskap är nästan okänd.

Familj: Herpelidae Tidigare namn: *Boulengerula taitanus; Afrocaecilia taitana*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**24-30 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Grävande**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**90-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Direkt utveckling (inga larver)**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**24 mån.**
Ägg per säsong	**5**
Yngelvård	**Vaktar äggen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Boulengerula taitana*. Klimatet i Taitabergen är tropiskt men milt på grund av höjden, med två regntider, och arten lever i fuktig, lös jord.
TEMPERATUR	Temperaturen i jorden är inte uppmätt för arten. 21-24 °C på dagen och 19-22 °C på natten är en uppskattning som passar landlevande maskgroddjur och ett milt bergsklimat.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Botten ska vara jämnt fuktig, och luften i lådan är nästan mättad, 90-100 %. Spraya botten med flaskvatten, regnvatten eller avklorerat kranvatten, och vänd på de översta centimetrarna då och då så att fukten fördelas.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Arten ska inte ha vattenskål eller vattendel. Kondens på lådans väggar räcker att dricka av, och vattnet används bara för att hålla botten fuktig.
LJUS OCH UVB	Arten lever under jorden och behöver varken UVB eller annan belysning. Rummets vanliga dygnsrytm med 10-14 timmars ljus räcker. Lådan hålls mörk och ska inte stå i direkt sol.
UTFODRING	I naturen äter *Boulengerula taitana* framför allt termiter och daggmaskar; ungarna tar mest daggmaskar. I fångenskap är små daggmaskar det mest realistiska grundfodret.
BETEENDE OCH HANTERING	*Boulengerula taitana* lever dolt under jorden, och ett friskt djur ligger nedgrävt största delen av tiden. Arten hålls enskilt så att vikt och hälsa är lätta att följa.
NATURLIG UTBREDNING	Kenya.