herpy

MASKGRODDJUR

Congo Caecilian

Herpele squalostoma

Herpele squalostoma är ett kraftigt, grävande maskgroddjur från Centralafrikas regnskog, plantager och trädgårdar, upp till omkring 46 cm långt. Arten lägger ägg i jorden, och honan ligger ihoprullad runt ägg och ungar, som lever av hennes yttersta hudlager. Arten har visat sig härdig i fångenskap jämfört med andra maskgroddjur.

Familj: Herpelidae Tidigare namn: *Caecilia squalostoma*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**24-46 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Grävande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**90-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Direkt utveckling (inga larver)**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per säsong	**16**
Yngelvård	**Vaktar äggen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

H. squalostoma hålls i små antal, och skötseln bygger på arten själv och på andra landlevande maskgroddjur. Djuret är landlevande och grävande, så skötseln handlar om jorden.

TEMPERATUR

Arten hålls stabilt och ljumt: 22-25 °C på dagen och 21-23 °C på natten. Genomsnittstemperaturen i jorden påverkar hur mycket djuren äter, så den ska hållas jämn.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luften i lådan är nästan mättad, 90-100 %, eftersom jorden är fuktig. Fukten upprätthålls genom att spruta jorden och ibland vända de översta centimetrarna. Känn efter, och spruta när det översta lagret känns torrt.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Arten ska inte ha vattenskål eller vattendel. Fukten kommer från jorden, och kondens på lådans väggar räcker att dricka av. En vattenskål kan göra jorden för blöt.

LJUS OCH UVB

Arten lever under jord, och ett särskilt ljusprogram behövs inte. Rummets vanliga dygnsrytm med 10-14 timmars ljus räcker. UVB behövs inte, och lådan hålls mörk så att djuret kan gräva ostört. Växter behövs inte.

UTFODRING

Daggmaskar är en beprövad baskost: unga djur kan växa upp till stora, kraftiga vuxna på enbart daggmaskar, när maskarna gut-loadas med kalk och vitaminer.

BETEENDE OCH HANTERING

H. squalostoma tillbringar nästan hela livet under jord och ses sällan på ytan. Arten hålls oftast ensam, så att tillstånd och tillväxt är lätta att följa; flera djur kan hållas tillsammans med regelbunden kontroll.

NATURLIG UTBREDNING

Nigeria, Kamerun, Ekvatorialguinea, Gabon, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa och Centralafrikanska republiken.