herpy

MASKGRODDJUR

Kaup's Caecilian

Potamotyphlus kaupii

Potamotyphlus kaupii är ett helt vattenlevande, ålliknande maskgroddjur från flodsystemen i Amazonas och Orinoco. Den har ett mindre huvud och en ljusare färg än *Typhlonectes* och kräver rent, syrerikt vatten. Arten föder levande ungar och är svårare att hålla än de närstående *Typhlonectes*-arterna.

Familj: Typhlonectidae Tidigare namn: *Potomotyphlus kaupii* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-70 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**60-114 g**
Livslängd	**16 år**
Aktiv	**På dagen, i skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**100 × 45 × 45 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**26-29 °C**
Temperatur, natt	**26-29 °C**
Luftfuktighet	**100 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 30-35 cm
Vattentemperatur	**26-29 °C**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter, färdigfoder, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**I grupp**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Utveckling	**Levandefödande**
Kullstorlek	**1-9 ungar**
Dräktighet	**180-300 dagar**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Potamotyphlus kaupii hålls i ett akvarium. Skötseln är mindre känd än för *Typhlonectes*, och akvariet ska efterlikna steniga, syrerika vattendrag snarare än grumligt, stillastående vatten.

TEMPERATUR
Vattentemperaturen ska vara 26-29 °C och hållas stabil; arten förökar sig utan årstidsväxlingar. Under dräktigheten är 29 °C bra, eftersom det ger fler livskraftiga ungar.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten har ingen betydelse, eftersom djuret lever i vattnet. Luften under ett tättslutande lock är mättad med fukt, och därför står det 100 % i rutan. Det som räknas är vattnets kvalitet; se avsnittet om vatten.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Maskgroddjur tar upp ämnen genom huden, så vattenkvaliteten är avgörande. Filtret ska vara inkört innan djuren sätts i.

LJUS OCH UVB
Vanlig akvariebelysning 12 timmar per dygn räcker. Djuren föredrar mörker, så det ska alltid finnas mörka gömställen.

UTFODRING
Potamotyphlus kaupii äter animalisk föda som de närstående *Typhlonectes*-arterna: daggmaskar, syrsor, skalbaggslarver, räkor och andra kräftdjur, myggstyng, tinad fisk och färdigfoder för groddjur.

BETEENDE OCH HANTERING
Djuren är sociala och ligger tillsammans i gömställen, och de hålls i grupper. Vid utfodring kan de bita varandra i iver efter maten. I akvariet är de aktiva både dag och natt.

NATURLIG UTBREDNING
Brasilien, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela och Franska Guyana.