herpy

MASKGRODDJUR

Aqua Ize Caecilian

Schistometopum thomense

Schistometopum thomense är ett benlöst, grävande maskgroddjur som bara lever på São Tomé och den lilla grannön Ilhéu das Rolas i Guineabukten. Det är ofta klart gult, föder levande, färdigutvecklade ungar och är ett av de få maskgroddjur som har fötts upp i fångenskap. Skötseln handlar om djup, fuktig jord utan gödning och bekämpningsmedel.

Familj: Dermophiidae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-34 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen och på natten**
Levnadssätt	**Grävande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Utveckling	**Levandefödande**
Könsmogen	**24 mån.**
Kullstorlek	**1-16 ungar**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 30 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**85-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Arten är landlevande och gräver, så skötseln handlar om jorden. Den hålls och föds upp i små antal, och skötseln bygger på arten själv och på andra landlevande maskgroddjur.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen är 21-24 °C och nattemperaturen 20-22 °C, vilket motsvarar jorden i artens bergsskogar. Uppvärmning behövs som regel inte i ett rum med stabil temperatur.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten i lådan ligger på 85-100 %, eftersom jorden är fuktig. Fukten upprätthålls genom att duscha jorden och då och då vända de översta centimetrarna.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Arten ska inte ha vattenskål eller vattendel. Fukten kommer från jorden, och kondens på lådans väggar räcker att dricka av. Den simmar mycket klumpigt, och djupt vatten är en drunkningsrisk.
LJUS OCH UVB	Arten är aktiv både dag och natt och visar sig i början ofta på ytan; efter några veckors tillvänjning ses den mer sällan. Ett särskilt ljusprogram behövs inte, och rummets vanliga dygnsrytm med 10-14 timmars ljus räcker.
UTFODRING	Daggmaskar är grundfoder, och vaxmott-larver tas också. Ett vuxet djur får 10-15 små daggmaskar varannan vecka. Gräv regelbundet igenom jorden: många kvarvarande maskar betyder överutfodring eller ett djur som inte äter.
BETEENDE OCH HANTERING	*S. thomense* gräver omfattande gångsystem. I naturen ligger flera djur tillsammans i samma trädstubbe. Arten kan sticka upp huvudet ur jorden och ligga så i upp till 20 minuter utan att reagera på rörelser i närheten.
NATURLIG UTBREDNING	São Tomé och Príncipe.