herpy

MASKGRODDJUR

Rubber Eel

Typhlonectes natans

Typhlonectes natans är ett helt vattenlevande, benlöst groddjur från Colombia och Venezuela med en lång, slät, mörkt blågrå kropp, små ögon under huden och en låg ryggfena. Arten föder levande ungar och hålls i ett varmt, mjukt och väl filtrerat akvarium med ett tungt, tättslutande lock.

Familj: Typhlonectidae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**25-73 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**40-250 g**
Livslängd	**10-14 år**
Aktiv	**På dagen, i skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Akvatisk**
Biotop	**Savann och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 45 × 50 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Temperatur, natt	**24-30 °C**
Luftfuktighet	**100 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 30-40 cm
Vattentemperatur	**24-30 °C**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter, färdigfoder, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**I grupp**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Utveckling	**Levandefödande**
Könsmogen	**48 mån.**
Kullstorlek	**1-11 ungar**
Dräktighet	**210-300 dagar**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Typhlonectes natans hålls i ett akvarium. Tre vuxna djur behöver minst 120 × 45 × 50 cm (omkring 250 liter) med ett stort externt filter. Ju större vattenmängd, desto stabilare vattenkvalitet.

TEMPERATUR

Vattentemperaturen ska vara 24-30 °C. En naturlig årstidsvariation inom det intervallet efterliknar floderna i utbredningsområdet och kan hjälpa till att få igång avel. Vid omkring 32 °C uppstår värmestress.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten har ingen betydelse, eftersom djuret lever i vattnet. Luften under ett tättslutande lock är mättad med fukt, och därför står det 100 % i rutan. Det som räknas är vattenkvaliteten; se avsnittet om vatten.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Maskgrodor tar upp ämnen genom huden, så vattenkvaliteten är avgörande. Filtret ska vara inkört innan djuren sätts i. Kranvatten behandlas med vattenberedare, luftas och får stå ett dygn vid akvariets temperatur innan det fylls på.

LJUS OCH UVB

Vanlig akvarielampa 12 timmar om dygnet räcker. Djuren föredrar mörker, så det ska alltid finnas mörka gömmen. Behovet av UVB är inte känt, och UVB-ljus ger ingen påvisbar skillnad för skelettet, så det är inte nödvändigt.

UTFODRING

Typhlonectes natans äter nästan allt köttfoder: daggmaskar, syrsor, skalbaggslarver, räkor och andra kräftdjur, musslor, myggstyngslarver, upptinad fisk, nyfödda möss och färdigfoder för groddjur.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är fredlig, inte revirhävdande och trivs bäst i en grupp där djuren delar gömmen. Under utfodring kan de bita varandra i iver efter maten, och under yngeltiden kan hanarna vara aggressiva mot varandra och jaga honorna.

NATURLIG UTBREDNING

Colombia och Venezuela.