herpy

ORMAR

Kenyansk sandboa

Eryx colubrinus

Eryx colubrinus är en liten, kraftigt byggd boa från Östafrikas torra områden. Den tillbringar största delen av tiden nedgrävd i sand med bara de uppåtvända ögonen över ytan. Den är lugn, kräver inte mycket utrymme och kan bli 20-30 år gammal, så den är ett bra val för den som vill ha sin första orm.

Familj: Boidae Engelska: Kenyan Sand Boa Tidigare namn: *Gongylophis colubrinus; Eryx thebaicus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**40-65 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**20-30 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Öken och halvöken**
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Värmeplats	**33-35 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Kullstorlek	**10-20 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**120-180 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

En vuxen *Eryx colubrinus* behöver ett terrarium på minst 60 × 30 × 30 cm (längd × bredd × höjd), gärna 90 × 45 × 45 cm. Honor som är större än genomsnittet behöver mer än minimimåttet.

TEMPERATUR

Eryx colubrinus tål torra, varma förhållanden. Det ska finnas en varm och en sval ände. Ytan under värmekällan ska vara 33-35 °C och den svala änden 26-28 °C. På natten får temperaturen sjunka till 22-25 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Eryx colubrinus lever i ett torrt klimat, och terrariet ska vara torrt största delen av tiden. Luftfuktigheten ligger bäst omkring 20-40 %. Siffran är en uppskattning utifrån levnadsmiljön.

LJUS OCH UVB

Eryx colubrinus är mest aktiv i skymningen och på natten och kan leva utan UVB, men ett svagt UVB-rör rekommenderas, eftersom det stöder dygnsrytmen och täcker behovet av D3-vitamin.

UTFODRING

Eryx colubrinus är köttätare och tar hela byten. Basfodret är möss: vuxna honor kan ta en stor vuxen mus, vuxna hanar en stor hoppermus.

BETEENDE OCH HANTERING

Eryx colubrinus är lugn och biter sällan. Låt nya djur vänja sig i två veckor och börja hantera dem först när de äter regelbundet.

NATURLIG UTBREDNING

Egypten, Sudan, Sydsudan, Etiopien, Eritrea, Kenya, Tanzania och Somalia.