herpy

ORMAR

Speckled Kingsnake

Lampropeltis holbrooki

Lampropeltis holbrooki är en medelstor till stor kungsorm från centrala och södra USA, svart med en liten gulvit fläck på nästan varje fjäll, så att mönstret liknar salt och peppar. Den blir 90-120 cm, äter gnagare, ödlor, grodor och andra ormar och är robust och lätt att sköta. Den hålls enstaka i ett golvterrarium med värmeplats och måttlig luftfuktighet och kan bli över 20 år.

Familj: Colubridae Tidigare namn: *Lampropeltis getula holbrooki; Coronella sayi*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**90-120 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Våtmark och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**21-28 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**5-15 ägg**
Inkubation	**60-70 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns lite artspecifik kunskap om skötseln av *Lampropeltis holbrooki*. Siffrorna här är lånade från kungsormar i allmänhet, särskilt *Lampropeltis californiae* och *Lampropeltis getula*, som har samma krav.

TEMPERATUR

Djuret reglerar sin temperatur genom att flytta mellan varma och kalla platser, så terrariet ska ha en tydlig gradient. Ytan under värmelampan ska vara 29-32 °C, mätt med en infraröd termometer, och den kalla änden 21-26 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 40-60 %, mätt med en digital hygrometer mitt i terrariet. Den är högre i den kalla änden och på natten och lägre i den varma änden, och det är normalt.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och solar sig i naturen. Den klarar sig utan UVB, men UVB rekommenderas för bästa välfärd. Det passar Ferguson-zon 2.

UTFODRING

L. holbrooki är köttätare och ska ha hela bytesdjur. Möss är standardfoder, och när djuret växer används unga råttor.

BETEENDE OCH HANTERING

L. holbrooki är robust och tolerant. Ge ett nytt djur omkring 2 veckors ro, och börja först hantera när det äter regelbundet. Börja med korta omgångar på högst 5 minuter, och lyft djuret underifrån, med stöd under kroppen.

NATURLIG UTBREDNING

USA.