herpy

ORMAR

Black Kingsnake

Lampropeltis nigra

Lampropeltis nigra är en medelstor till stor kungsorm från östra USA, svart, och i den södra delen av utbredningen har varje fjäll en liten gul eller vit fläck. Den blir 90-120 cm, äter gnagare, ödlor, grodor och andra ormar och är robust och lätt att sköta. Den hålls ensam i ett golvterrarium med värmeplats och måttlig luftfuktighet och kan bli över 20 år.

Familj: Colubridae Tidigare namn: *Lampropeltis getula nigra; Ophibolus getulus niger*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**90-120 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Våtmark och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**21-28 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**5-15 ägg**
Inkubation	**60-70 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns lite artspecifik kunskap om skötseln av *Lampropeltis nigra*. Värdena här är lånade från kungsormar i allmänhet, särskilt *Lampropeltis californiae* och *Lampropeltis getula*, som har samma krav.

TEMPERATUR

Djuret reglerar sin temperatur genom att flytta sig mellan varma och kalla platser, så terrariet ska ha en tydlig gradient. Ytan under värmelampan ska vara 29-32 °C, mätt med en infraröd termometer, och den kalla änden 21-26 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 40-60 %, mätt med en digital hygrometer mitt i terrariet. Den är högre i den kalla änden och på natten och lägre i den varma änden, och det är normalt. Kvav luft ska undvikas.

LJUS OCH UVB

Arten är mest aktiv på dagen och solar sig i naturen. Den kan klara sig utan UVB, men UVB rekommenderas för bästa välfärd. Det motsvarar Ferguson-zon 2.

UTFODRING

L. nigra är köttätare och ska ha hela byten. Möss är standardfoder, och när djuret växer används unga råttor.

BETEENDE OCH HANTERING

L. nigra är robust och tolerant. Ge ett nytt djur omkring 2 veckor i fred, och börja hantera det först när det äter regelbundet. Börja med korta stunder på högst 5 minuter, och lyft djuret underifrån, med stöd under kroppen.

NATURLIG UTBREDNING

USA.