herpy

ORMAR

Mjölkorm

Lampropeltis triangulum

Lampropeltis triangulum är en smal, tillbakadragen orm från östra Nordamerika. Namnet omfattade länge en hel grupp färgstarka ormar, och många av dem som säljs under det hör i dag till andra arter. Ormen är nattaktiv, lugn och lätt att hålla, men lever av gnagare och får inte bo tillsammans med andra ormar.

Familj: Colubridae Engelska: Eastern milksnake

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**55-115 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Vintervila	**11-13 °C** 10-12 veckor
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**36-48 mån.**
Kullstorlek	**2-24 ägg**
Kullar per år	**1**
Inkubation	**58-65 dagar** vid 27-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

En vuxen *Lampropeltis triangulum* behöver ett terrarium på minst 120 × 60 × 45 cm. Små djur under 90 cm klarar sig med 90 × 45 × 45 cm. Ungar kan börja i en liten box och flyttas upp i takt med tillväxten.

TEMPERATUR

Lampropeltis triangulum är nattaktiv och värmer sig mest under stenar och andra föremål som solen har värmt upp, men solar sig ibland öppet. Solplatsen ska vara 29-32 °C på ytan, den svalare änden 23-27 °C och natten 21-23 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

En relativ luftfuktighet på 40-60 % är lämplig. Den får gärna vara högre i den svala änden och på natten och lägre i den varma änden. Mät i mitten av terrariet med en digital hygrometer.

LJUS OCH UVB

Arten är nattaktiv och behöver inte starkt ljus. UVB är inte nödvändigt, men kan vara gynnsamt.

UTFODRING

Vuxna *Lampropeltis triangulum* matas med möss och unga råttor, och stora individer tar små till medelstora råttor. Bytet ska vara fruset och upptinat och inte mer än 1,5 gånger så brett som ormens bredaste ställe.

BETEENDE OCH HANTERING

Lampropeltis triangulum är oftast lugn och tål hantering väl, men enstaka djur är nervösa och biter. Efter hemkomsten får djuret en eller två veckor på sig att vänja sig, och hanteringen börjar först när det äter regelbundet.

NATURLIG UTBREDNING

Kanada och USA.