herpy

ORMAR

## Strumpebandssnok

# *Thamnophis sirtalis*

*Thamnophis sirtalis* är en smal, dagaktiv och nyfiken orm med ljusa ränder längs kroppen. Den lever vid vatten från södra Kanada genom större delen av USA till norra Mexiko. Den är härdig, håller sig vaken och synlig om dagen och kan leva på upptinade möss, men den är en mästare på att rymma och kräver ett helt tätt terrarium.

Familj: Colubridae  Engelska: Common Garter Snake

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **50-100 cm**<br>total längd inkl. svans |
| Livslängd | **6-10 år** |
| Aktiv | **På dagen** |
| Levnadssätt | **Marklevande och semiakvatisk** |
| Biotop | **Våtmark och tempererad skog och äng** |
| Svårighetsgrad | **Nybörjare** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **100 × 50 × 50 cm**<br>L × B × H för 1 vuxet djur |
| Temperatur, dag | **23-27 °C** |
| Värmeplats | **29-32 °C** |
| Temperatur, natt | **18-22 °C** |
| Luftfuktighet | **35-60 %** |
| Vatten | **Vattenskål** |
| UVB | **Rekommenderas**<br>Fergusonzon 2 |
| Vintervila | **8-15 °C**<br>8-16 veckor |
| Föda | **Ryggradsdjur och maskar/sniglar** |
| Hålls | **Ensamma eller i grupp** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Levandefödande** |
| Könsmogen | **18-24 mån.** |
| Kullstorlek | **10-40 ungar** |
| Kullar per år | **1** |
| Dräktighet | **60-90 dagar** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ej listad** |
| EU-bilaga | **Ej listad** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | En vuxen *Thamnophis sirtalis* ska ha ett terrarium på minst 100 × 50 × 50 cm (längd × bredd × höjd), och en hona över 80 cm ska ha 120 × 60 × 60 cm. |
| **TEMPERATUR** | Det ska finnas en tydlig värmegradient. Solplatsen ska vara 29-32 °C mätt på ytan, den svala änden 23-27 °C och natten 18-22 °C. Värmekällan släcks på natten. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN** | Luftfuktigheten ska ligga på 35-60 %, högst i den svala änden och på natten. Terrariet ska inte vara vått, för ihållande fukt ger blåsor på buken. |
| **LJUS OCH UVB** | Arten är dagaktiv och trivs med kraftigt dagsljus. UVB är inte strängt nödvändigt, men rekommenderas och gör ofta ormen mer aktiv. |
| **UTFODRING** | *Thamnophis sirtalis* tar andra bytesdjur än de flesta ormar: daggmaskar, fisk och gnagare. Insekter som syrsor och mjölmaskar äter den inte. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | *Thamnophis sirtalis* är snabb och nyfiken och blir oftast tam om den hanteras regelbundet från ung. Låt nya djur komma till ro i omkring två veckor, och börja först hantera dem när de äter stadigt. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Kanada, Mexiko och USA. |