herpy

PILGIFTSGRODOR

Adelphobates quinquevittatus

Adelphobates quinquevittatus är en mycket liten, blankt lackerad svart pilgiftsgroda på 14-16 mm med vita ränder och grå, grönaktiga eller orange ben. Den lever i regnskogens lövstreck i Rio Madeiras avrinningsområde i södra Amazonas och hålls bara sällan. Det finns mycket lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Rio Madeira Poison Frog Tidigare namn: *Dendrobates quinquevittatus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**14-16 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**4-8**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och andra grodyngel**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns mycket lite kunskap om skötseln av *Adelphobates quinquevittatus*. Arten lever i lövstreck i ett varmt och fuktigt låglandsklimat.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen ska ligga på 24-27 °C, och på natten sjunker den 3-4 °C, till 20-24 °C. Svängningen över året ska vara liten, 1-2 °C. Det passar med låglandsklimatet i Rondônia.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara omkring 70-80 % mitt på dagen och nära 100 % på morgonen och kvällen, och lövlagret och substratet ska vara fuktiga hela tiden.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En vattenskål är inte nödvändig om man inte vill ha yngel. Grodorna får fukten från sprayning och det fuktiga lövet.
LJUS OCH UVB	Ge 10-12 timmars ljus om dagen med lysrör eller LED till växterna. I naturen lever arten i skuggan under skogens kronor, så ljuset ska ge växterna nog för att växa utan att värma upp terrariet.
UTFODRING	*A. quinquevittatus* lever i naturen mest av myror och termiter. I fångenskap matas den med små bananflugor (*Drosophila melanogaster*), hoppstjärtar, mikrosyrsor, små vaxmalslarver, siktat ängsplankton och små gråsuggor.
BETEENDE OCH HANTERING	*A. quinquevittatus* är dagaktiv och lever mest i lövstreck. Temperament och revirbeteende är inte dokumenterade.
NATURLIG UTBREDNING	Brasilien.