herpy

PILGIFTSGRODOR

Allobates femoralis

Allobates femoralis är en liten, mörk groda på 3-4 cm från Amazonas och Guyanaskölden med en orangegul fläck bakom armen och en halvmåneformad orange fläck på låret. Den är dagaktiv och markbunden, hanarna försvarar revir med ett högt läte, och uppvaktningen är en av de längsta bland pilgiftsgrodorna. Arten tillhör familjen Aromobatidae och räknas som ogiftig.

Familj: Aromobatidae Engelska: Brilliant-thighed Poison Frog Tidigare namn: *Epipedobates femoralis; Phyllobates femoralis; Dendrobates femoralis* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**8-20**
Kläckning	**15-20 dagar**
Larvtid	**40-50 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par *Allobates femoralis* kan hållas i ett glasterrarium på 60 × 40 × 40 cm, och minst 50 × 50 × 50 cm nämns också. Arten lever på marken, så golvytan räknas mest, men hanarna klättrar gärna lite uppåt för att ropa.

TEMPERATUR

Dagstemperaturen ska ligga på 25-28 °C, och på natten sänks den 3-4 grader. Ett dagligt förlopp från omkring 21 °C på natten till 28 °C på dagen motsvarar förhållandena i Franska Guyana och har gett goda resultat vid avel.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska vara hög: 70-80 % mitt på dagen och upp mot 100 % morgon och kväll.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ge en låg glasskål på omkring 10 cm i diameter med 1-2 cm vatten, som grodorna lätt tar sig upp ur. Den används också av hanen när han ska lämna av grodynglen.

LJUS OCH UVB

Ljuset är först och främst till för växterna. 12 timmars ljus om dagen, till exempel från kl. 7 till 19, har fungerat bra, och lysrör eller LED på omkring 6.500 K ger naturliga färger och god växtlighet.

UTFODRING

Allobates femoralis lever av små insekter. I terrariet består grundfodret av vinglösa bananflugor, kompletterade med hoppstjärtar, helt små syrsor, små vaxmalslarver och ängsplankton.

BETEENDE OCH HANTERING

Allobates femoralis är dagaktiv, och hanarna är revirhävdande.

NATURLIG UTBREDNING

Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Franska Guyana, Guyana, Peru och Surinam.