herpy

PILGIFTSGRODOR

Allobates zaparo

Allobates zaparo är en liten, dagaktiv groda på omkring 3 cm från regnskogen vid Andernas fot i Ecuador och norra Peru. Vuxna djur har röd rygg, svarta sidor, blå buk och gula fläckar vid benen och efterliknar de giftiga *Ameerega bilinguis* och *Ameerega parvula*, men är själva ogiftiga. Arten hålls bara sällan, så skötseln bygger på klimatet och på släktingen *Allobates femoralis*.

Familj: Aromobatidae Engelska: Sanguine Poison Frog Tidigare namn: *Epipedobates zaparo; Phyllobates zaparo; Dendrobates zaparo*
Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**8-20**
Kläckning	**15-20 dagar**
Larvtid	**40-50 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Allobates zaparo*. Arten hålls bara sällan, och avel i fångenskap är inte beskriven.

TEMPERATUR
Håll terrariet på 24-27 °C på dagen och 21-23 °C på natten. Uppgifterna följer klimatet i Ecuadors lågland vid Andernas fot och ligger något under dem som gäller för *Allobates femoralis* (25-28 °C på dagen).

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ska vara 70-80 % mitt på dagen och nära 100 % på morgonen och kvällen.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Ge en låg glasskål med 1-2 cm vatten som grodorna lätt kommer upp ur. Skålen används av de vuxna när grodynglen ska sättas av. Använd regnvatten, osmosvatten eller avklorerat kranvatten, och byt det ofta.

LJUS OCH UVB
Ljuset är framför allt till växterna: 10-12 timmar om dagen med LED-ljus med växtanpassat spektrum. Det är inte dokumenterat att *Allobates zaparo* behöver UVB.

UTFODRING
I naturen är myror en viktig del av kosten. I terrariet består grundfodret av vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), hoppstjärtar och siktat ängsplankton, kompletterat med helt små syrsor och små gråsuggor.

BETEENDE OCH HANTERING
Allobates zaparo är dagaktiv och lever på lövlagret. Hanarna ropar från ovansidan av lövet för att locka honor.

NATURLIG UTBREDNING
Ecuador och Peru.