herpy

PILGIFTSGRODOR

Ameerega bassleri

Ameerega bassleri är en dagaktiv pilgiftsgroda på knappt 4 cm från de fuktiga skogarna vid Andernas östra fot i norra Peru. Hanen vaktar äggen och bär grodynglen till vattnet, och arten ska hållas svalare än de flesta pilgiftsgrodor. Det finns bara lite kunskap om skötseln, och arten är sårbar i naturen.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Pleasing Poison Frog Tidigare namn: *Epipedobates bassleri; Dendrobates bassleri; Phobobates bassleri*
Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Könsmogen	**12-13 mån.**
Ägg per läggning	**40**
Kläckning	**10 dagar**
Larvtid	**50-60 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 50 × 55 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-21 °C**
Temperatur, natt	**13-17 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ameerega bassleri*. Arten lever i fuktig skog vid bäckar på 300-1.200 m höjd, där luften är svalare än hos de flesta pilgiftsgrodor.
TEMPERATUR	Arten får inte hållas för varmt. På dagen passar 18-21 °C, och på natten ska temperaturen sjunka 4-6 °C, till omkring 13-17 °C. Skillnaden mellan årstiderna är bara 1-2 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 70-100 %. Morgon och kväll ligger den nära 100 % med dimma, medan den mitt på dagen får sjunka till omkring 70 %.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En vattenskål med 1-2 cm vatten ska finnas i terrariet, och en fast vattendel eller små behållare används till grodynglen vid avel. Använd regnvatten eller osmosvatten och byt vattnet flera gånger i veckan.
LJUS OCH UVB	Arten lever på skogsbotten, dit bara lite ljus når ned. LED-ljus med ett spektrum anpassat för växter och 10-12 timmars dagslängd räcker.
UTFODRING	Arten tar de vanliga små foderdjuren: bananflugor, hoppstjärtar, nykläckta syrsor, de minsta vaxmalslarverna och håvade småinsekter från ängen. Utfodra varannan dag med så mycket som djuren äter på ungefär en timme.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är dagaktiv och lever på marken. Hanen är revirhävdande och kallar för att försvara sitt område, så djuren ska ha många gömställen och avbrutna siktlinjer.
NATURLIG UTBREDNING	Peru.