herpy

PILGIFTSGRODOR

Ameerega bilinguis

Ameerega bilinguis är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 17-23 mm från regnskogens lövlager i nordvästra Amazonas låglandet. Ryggen är svart med röda knottror, och undersidan är ljusblå med svarta teckningar. Arten hålls sällan, och det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Ecuador Poison Frog Tidigare namn: *Epipedobates bilinguis* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**17-23 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**4-16**
Kläckning	**10-22 dagar**
Larvtid	**70-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-26 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ameerega bilinguis*, men arten hålls i små antal, och grundsiffrorna för terrariet är kända. Den sköts som andra små *Ameerega*-arter från regnskogens lövlager.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen är 25-26 °C, och på natten sänks den 4-5 grader till 20-22 °C. Arten är knuten till skogsbottens jämna klimat och tål värme dåligt; temperaturer över 28 °C är en risk, särskilt om luften samtidigt står stilla.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten är 70-80 % på dagen, med en dipp till omkring 70 % mitt på dagen, och nära 100 % morgon och kväll, gärna med dimma.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

En platt vattenskål med 1-2 cm vatten ger grodorna möjlighet att dricka och är nödvändig om det ska födas upp, eftersom hanen sätter av grodynglen där. Skålen ska ha en sluttning eller sten så att en groda kan ta sig upp igen.

LJUS OCH UVB

Ljuset ska först och främst ge växterna en dag-nattrytm på omkring 12 timmar, och här räcker en LED-lampa för växter. UVB är inte nödvändigt för pilgiftsgrodor, så det är valfritt.

UTFODRING

Födan är små, levande leddjur: hoppstjärtar och bananflugor (*Drosophila melanogaster*), mikrosyrsor, siktat ängsplankton och små gråsuggor. Grodan är liten, så större foderdjur som *Drosophila hydei* passar bara de vuxna.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är dagaktiv och lever mest på marken, men hanarna klättrar gärna upp på lite upphöjda platser för att kalla. Den kan hållas i par eller i en grupp, om terrariet är tillräckligt stort för att hanarna ska kunna hålla avstånd.

NATURLIG UTBREDNING

Colombia, Ecuador och Peru.