herpy

PILGIFTSGRODOR

Ameerega cainarachi

Ameerega cainarachi är en rödryggad pilgiftsgroda på omkring 3 cm som bara är känd från bergsfoten runt Tarapoto i norra Peru. Arten är hotad i naturen, och det finns bara lite kunskap om skötseln, så vägledningen bygger på klimatet, livsmiljön och de nära släktingarna *Ameerega bassleri* och *Ameerega pepperi*.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Cainarachi Poison Frog Tidigare namn: *Epipedobates cainarachi; Epipedobates ardens* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**12-13 mån.**
Ägg per läggning	**22-44**
Kläckning	**10 dagar**
Larvtid	**50-60 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ameerega cainarachi*. Arten lever i samma område som *Ameerega bassleri* och *Ameerega pepperi*, och aveluppgifterna är lånade från dem (se Avel).
TEMPERATUR	På dagen passar 22-26 °C, och på natten ska temperaturen sjunka upp till 5 °C, till omkring 19-22 °C. Skillnaden mellan årstiderna är bara 1-2 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 70-100 %: omkring 70 % mitt på dagen och nära 100 % med dimma morgon och kväll. Spraya eller använd regnsystem och dimmaskin ett par gånger om dagen.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål med 1-2 cm vatten räcker, och den ska vara lätt att ta sig in i och ut ur. Använd regnvatten, osmosvatten eller avklorerat kranvatten, och byt vattnet varannan dag så att det inte samlas bakterier.
LJUS OCH UVB	Ljuset ska först och främst täcka växternas behov: LED-ljus för växttillväxt i 10-12 timmar om dagen med en tydlig natt. Behovet av UVB är inte dokumenterat; en svag UVB-lampa (Ferguson-zon 1) är valfri.
UTFODRING	Grodorna tar de vanliga små foderdjuren: bananflugor (*Drosophila melanogaster* och *Drosophila hydei*), hoppstjärtar, små gråsuggor, nykläckta syrsor, de minsta vaxmalslarverna och håvade småinsekter från ängen.
BETEENDE OCH HANTERING	*Ameerega cainarachi* är dagaktiv och håller till på skogsbotten. Hanarna i släktet är revirhävdande och kallar från fasta platser.
NATURLIG UTBREDNING	Peru.