herpy

PILGIFTSGRODOR

Ameerega hahneli

Ameerega hahneli är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 17-22 mm med ljusa sidostreck och blå buk, som lever i regnskogens lövlager i stora delar av Amazonas låglandet. Hanen bär grodynglen till rinnande vatten, och grodynglen kräver ström i vattnet. Arten är vanlig i naturen men sällsynt i fångenskap.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Yurimaguas Poison Frog Tidigare namn: *Epipedobates hahneli; Dendrobates hahneli* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**17-22 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**6-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**7-12 mån.**
Ägg per läggning	**6-33**
Kläckning	**4-16 dagar**
Larvtid	**55-65 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**23-25 °C**
Temperatur, natt	**19-21 °C**
Luftfuktighet	**65-90 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara begränsad kunskap om skötseln av *Ameerega hahneli*, och kraven kan variera mellan de olika formerna och eventuella dolda arter. *Ameerega trivittata* lever i samma del av Amazonas och är bättre känd i fångenskap.
TEMPERATUR	På dagen passar omkring 25 °C och på natten omkring 19 °C. Lysrör utanför terrariet kan ge både ljus och den värme som behövs. Över 28 °C finns risk för stress; kyl med en fläkt och extra sprayning.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 65-90 %. Spraya eller använd regnsystem tre gånger om dagen med osmosvatten, gärna blandat med lite kranvatten (omkring 15 %), och låt lövlagret torka lite mellan sprayningarna så att det inte bildas mögel.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Det ska alltid finnas lite vatten att gå till, till exempel i dräneringsrännan eller en låg vattenskål med 1-2 cm vatten. Under torrtiden töms rännan inte, så att djuren fortfarande har tillgång till vatten.
LJUS OCH UVB	Ljuset kan vara lysrör eller LED med ett spektrum anpassat för växter i 10-12 timmar. UVB är inte nödvändigt; ett svagt UVB-rör (Ferguson-zon 1) kan användas när det finns gömställen, så att djuren kan dra sig undan ljuset.
UTFODRING	Den lilla bananflugan (*Drosophila melanogaster*) är det viktigaste fodret. Vuxna djur tar också den stora bananflugan (*Drosophila hydei*), men hoppar ofta över den eftersom den är lite för stor.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är dagaktiv och lever på marken, men är mest aktiv tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen och kvällen; resten av dagen är den mer skygg.
NATURLIG UTBREDNING	Brasilien, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Franska Guyana och Surinam.