herpy

PILGIFTSGRODOR

# *Ameerega parvula*

*Ameerega parvula* är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 18-24 mm från regnskogens lövlager i västra Amazonas låglandet och vid foten av Anderna. Ryggen är svart med mörkröda fläckar, och undersidan är blå och svart marmorerad. Arten hålls sällan, och det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae  Engelska: Ruby Poison Frog  Tidigare namn: *Epipedobates parvulus; Dendrobates parvulus*  Publicerad 16 november 2026

## FAKTARUTA

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **18-24 mm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **10-15 år** |
| Aktiv | **På dagen** |
| Levnadssätt | **Marklevande** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fångenskap | **Inget**<br>Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **40 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **25-26 °C** |
| Temperatur, natt | **20-22 °C** |
| Luftfuktighet | **70-100 %** |
| Vatten | **Vattenskål**<br>djup 1-2 cm |
| UVB | **Valfritt**<br>Fergusonzon 1 |
| Föda | **Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)** |
| Hålls | **Parvis** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodynglen bärs till vatten** |
| Äggläggning | **På marken** |
| Ägg per läggning | **4-16** |
| Kläckning | **10-22 dagar** |
| Larvtid | **70-90 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Alger/växter och färdigfoder** |
| Yngelvård | **Vaktar äggen och bär grodynglen** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ameerega parvula*. Arten lever i samma slags skog som den nära besläktade *Ameerega bilinguis*, som har samma storlek, och siffrorna för terrarium, klimat och avel är lånade därifrån.

**TEMPERATUR**

Dagtemperaturen är 25-26 °C, och på natten sänks den 4-5 grader till 20-22 °C. Arten är knuten till skogsbottens jämna klimat och tål värme dåligt; temperaturer över 28 °C är en risk, särskilt om luften samtidigt står stilla.

**LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING**

Luftfuktigheten är 70-80 % på dagen, med en dipp till omkring 70 % mitt på dagen, och nära 100 % morgon och kväll, gärna med dimma.

**VATTEN OCH VATTENKVALITET**

En platt vattenskål med 1-2 cm vatten ger grodorna möjlighet att dricka och är nödvändig om det ska födas upp, eftersom hanen sätter av grodynglen där. Skålen ska ha en sluttning eller sten så att en groda kan ta sig upp igen.

**LJUS OCH UVB**

Ljuset ska först och främst ge växterna en dag-nattrytm på omkring 12 timmar, och här räcker en LED-lampa för växter. UVB är inte nödvändigt för pilgiftsgrodor, så det är valfritt.

**UTFODRING**

Födan är små, levande leddjur: hoppstjärtar och bananflugor (*Drosophila melanogaster*), mikrosyrsor, siktat ängsplankton och små gråsuggor. Grodan är liten, så större foderdjur som *Drosophila hydei* passar bara de vuxna.

**BETEENDE OCH HANTERING**

Arten är dagaktiv och lever mest på marken. Hanarna kallar och försvarar förmodligen små revir, som släktingarna gör, så ett par är den säkra hållningsformen i ett mindre terrarium.

**NATURLIG UTBREDNING**

Colombia, Ecuador och Peru.