herpy

PILGIFTSGRODOR

# *Ameerega pepperi*

*Ameerega pepperi* är en liten, svart pilgiftsgroda med gula streck och röda, orange eller gula teckningar från centrala Peru. Den lever vid bäckar i skog på 380-1.000 m höjd och är sårbar på grund av avverkning. Det finns bara lite kunskap om skötseln, som därför bygger på livsmiljön och nära släktingar.

Familj: Dendrobatidae  Publicerad 16 november 2026

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **3 cm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **8-12 år** |
| Aktiv | **På dagen** |
| Levnadssätt | **Marklevande** |
| Biotop | **Regnskog och våtmark** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fångenskap | **Inget**<br>Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge |
| Svårighetsgrad | **Erfaren** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 45 × 45 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **21-25 °C** |
| Temperatur, natt | **18-21 °C** |
| Luftfuktighet | **75-100 %** |
| Vatten | **Vattenskål**<br>djup 1-2 cm |
| UVB | **Valfritt**<br>Fergusonzon 1 |
| Föda | **Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)** |
| Hålls | **Parvis** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodynglen bärs till vatten** |
| Äggläggning | **På marken** |
| Ägg per läggning | **22-44** |
| Larvtid | **35-60 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Färdigfoder** |
| Yngelvård | **Vaktar äggen och bär grodynglen** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| IUCN | **Sårbar (VU)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ameerega pepperi*. Arten lever vid bäckar i fuktig skog på 380-1.000 m höjd. |
| **TEMPERATUR** | Temperaturen är inte dokumenterad för arten; 21-25 °C på dagen och 18-21 °C på natten ligger mellan siffrorna för *Ameerega bassleri* och *Ameerega hahneli*. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING** | Luftfuktigheten ska vara 75-100 %. |
| **VATTEN OCH VATTENKVALITET** | En låg vattenskål med 1-2 cm vatten och en sten eller gren som landgång räcker. Använd regnvatten, osmosvatten eller avklorerat vatten och byt det var 2:a-3:e dag. |
| **LJUS OCH UVB** | Ge växtvänligt ljus i 10-12 timmar dagligen, med skugga och gömställen. UVB är inte dokumenterat som nödvändigt för arten, men en svag UVB-källa (Ferguson-zon 1) kan användas. Se till att ljuset inte värmer upp terrariet. |
| **UTFODRING** | *Ameerega pepperi* är liten och tar små foderdjur: bananflugor (mest *Drosophila melanogaster*, mindre *Drosophila hydei*), hoppstjärtar och små gråsuggor. Utfodra varje eller varannan dag med så mycket som djuren äter på en timme. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | Hanarna är revirhävdande och kallar från stenar. Arten hålls bäst som par i ett terrarium med många gömställen. Grodor bör inte hanteras, eftersom huden är ömtålig och hanteringen stressar djuren. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Peru. |

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilegiftfroeer/ameerega-pepperi