herpy

PILGIFTSGRODOR

# *Ameerega rubriventris*

*Ameerega rubriventris* är en liten, mörk pilgiftsgroda på 21-25 mm med ljusa sidostrimmor och en röd- eller orangesvart marmorerad buk. Den lever bara i skogarna vid Cordillera Azul i centrala Peru och är hotad. Arten hålls sällan, och det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae  Engelska: Cordillera Azul Poison Frog  Tidigare namn: *Epipedobates rubriventris*  Publicerad 16 november 2026

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **21-25 mm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **10-15 år** |
| Aktiv | **På dagen** |
| Levnadssätt | **Marklevande** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fångenskap | **Inget**<br>Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodynglen bärs till vatten** |
| Äggläggning | **På marken** |
| Ägg per läggning | **4-16** |
| Kläckning | **10-22 dagar** |
| Larvtid | **70-90 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Alger/växter och färdigfoder** |
| Yngelvård | **Vaktar äggen och bär grodynglen** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **50 × 50 × 50 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **25-28 °C** |
| Temperatur, natt | **21-25 °C** |
| Luftfuktighet | **70-100 %** |
| Vatten | **Vattenskål**<br>djup 1-2 cm |
| UVB | **Valfritt**<br>Fergusonzon 1 |
| Föda | **Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)** |
| Hålls | **Parvis** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| IUCN | **Starkt hotad (EN)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ameerega rubriventris*. Klimatet i bergsskogarna vid Cordillera Azul är varmt och fuktigt året runt, och arten sköts som andra små *Ameerega*-arter från regnskogens lövskikt. |
| **TEMPERATUR** | Dagstemperaturen är 25-28 °C, och på natten sänks den 3-4 grader till 21-25 °C. Temperaturen varierar bara 1-2 grader över året, och vinterdvala behövs inte. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING** | Luftfuktigheten är 70-80 % på dagen, med en dipp till omkring 70 % mitt på dagen, och nära 100 % morgon och kväll, gärna med dimma. |
| **VATTEN OCH VATTENKVALITET** | En låg vattenskål med 1-2 cm vatten räcker, och den ska vara lätt att ta sig in i och ut ur. Använd regnvatten, osmosvatten eller avklorerat kranvatten, och byt vattnet varannan dag så att bakterier inte samlas. |
| **LJUS OCH UVB** | Ljuset ska främst täcka växterna: en LED-lampa för växtodling i 10-12 timmar om dagen och en tydlig natt. UVB behövs inte för pilgiftsgrodor; en svag UVB-lampa (Ferguson-zon 1) är valfri. |
| **UTFODRING** | Grodorna äter små levande leddjur: bananflugor (*Drosophila melanogaster* och till de vuxna även *D. hydei*), hoppstjärtar, mikrosyrsor, små gråsuggor och siktat ängsplankton. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | *Ameerega rubriventris* är dagaktiv och håller till på skogsbotten, men klättrar gärna. Hanen kallar med ett fågelliknande pipande, oftast 2-3 korta visslingar i rad. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Peru. |